

reue le 26 Xbre
1758.

Ouvrage Sur Les accouchemens

~~85~~

n° 9.

ARC 39 n° 9

par m. maussion chsien En chef
De L'hôtel-Dieu d'Orléans

ce manuscrit lui a valu le prix fondé par M. Ferri



L'art des accouchemens était trop important par lui-même pour rester entre les mains des femmes qui n'ont pour toute connoissance qu'une routine aveugle et mal assurée. Les difficultés qui se présentent à chaque instant sont très souvent au-dessus de leurs forces. (a) En vain quelques médecins se sont élevés contre le défaut de pudeur, et même l'indécence des femmes de se faire accoucher par des hommes, on sent assez la faiblesse de cette assertion mal fondée sur le scrupule; elle tombe d'elle-même. En vain quelques autres, convaincus de la nécessité que les femmes fussent accouchées par les chirurgiens, sont convenus que l'exercice des accouchemens était véritablement du ressort de la chirurgie; mais ils ont prétendu que les maladies qui précèdent ou suivent ~~immédiatement~~ les accouchemens, étaient absolument du domaine de la médecine. Ce serait une erreur de les croire. Le chirurgien doit avoir la connoissance directe de toutes les maladies des femmes enceintes et accouchées. Tant que l'art des accouchemens a été exercé par des femmes, il est resté dans le cahos de l'ignorance, et les fautes sans nombre ont été cachées sous le voile le plus obscur. C'est sans doute le grand nombre d'accidens qui aura fait ouvrir

(a) madame Dubouclai autorisée par le gouvernement à instruire les femmes de campagnes, était accompagnée d'un accoucheur pour les cas de forces. journal de med. juillet 1771. tom. 38 pag. 79.

Les yeux aux savans, et l'esprit d'en abréger le cours les —
aura déterminés à jeter les premiers fondemens de cet art
si noble et si utile. Lorsque parloit les ouvrages des —
écrivains fut le développement de cette science, on y voit
par gradation ses progrès, et on est même surpris que les —
auteurs de ce livre l'aient portée aussi rapidement vers
la perfection. Parmi les auteurs français qui ont le mieux —
écrit sur la matière des accouchemens, on peut citer Guillemeau,
Dionis, Mauriceau, Lamotte, Puget; et plus récemment, Levret
l'a traitée à fond. Ce célèbre accoucheur, qui nous a laissé un
excellent ouvrage sur l'art des accouchemens démontré par des —
principes de physique et de mécanique, et un volume entier
d'observations sur les causes et les accidens de plusieurs —
accouchemens laborieux avec des remarques pour les terminer,
et de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément, —
consent avec les savans que la matière n'est pas épuisée.
Ce serait beaucoup entreprendre si j'essayais, d'après ces —
auteurs, de donner quelques nouvelles sur le vuide qui reste
à remplir: mes connaissances sont resserrées dans des bornes —
trop étroites pour y prétendre. Je m'occuperai seulement,
dans cet ouvrage à mettre sous les yeux de l'académie plusieurs
observations différentes entr'elles; mais qui toutes ont pour but
la matière des accouchemens. quoique la plus part de ces —
observations ait du rapport avec celles consignées dans les
ouvrages des écrivains déjà cités, il s'en trouvera néanmoins
quelques unes parmi elles qui me sont particulières, ne les ayant
vus nulle part, et qui méritent peut-être quelque attention par leur
singularité. Je commencerai par celles qui ont pour objet
les hémorragies utérines dont les suites si funestes aux mères et
à leurs enfans séparément ou ensemble, les enlèvent quelquefois
en très peu de tems: elles font le sujet de la première partie
qui sera terminée par une grosse trompeuse. on verra dans la
seconde partie plusieurs accouchemens différens entr'eux, et les
moyens que j'ai mis en usage pour les terminer: enfin j'ai

rassemble dans cet ouvrage tout ce qui m'a paru digne d'être remarqué.

Premiere partie

Sur les pertes



La cause prochaine des pertes dans tous les tems de la grossesse est sans contredit le détachement total ou partiel de l'arrière-faix. Cet accident est toujours déterminé par des causes premières telles que les coups, les chutes, les fortes compressions, les exercices et mouvemens forcés, la toux, les vomissemens, ainsi que l'usage immodéré du coït dans les premiers tems : Enfin les affections de l'ame comme la tristesse, la colère, la peur, la joie subite et inopinée peut encore être mise au nombre des causes primordiales des pertes. Les femmes saporées, surtout celles chez qui cette maladie est portée à un degré éminent, ne sont point exemptes de pertes dans tous les tems de leurs grossesses. Les femmes, sans être grosses d'enfants, peuvent ~~habuer~~ essuyer des pertes qui ont pour causes la présence de certains corps étrangers tels que des faux germes, des Carcinomes, des polypes, des masses d'idatiodes : (a) Or elles peuvent encore en éprouver par la seule dissolution de leur sang. Les filles qui ont usé du coït et qui ont des fleurs blanches ne sont point les seules à qui il peut se déclarer quelque fois des pertes ; il y en a qui quoiqu'à l'abri de tout soupçon par leur âge, en ont eu. Cela est fort rare, il est vrai ; mais je peux convaincre mes lecteurs par les ^{quatre} ~~trois~~ citations suivantes.

obs. M^{lle}... âgée de douze ans d'une constitution très faible portait depuis quelque tems une affection florbutique à la bouche contre laquelle les parents fort tranquilles n'avaient rien mis en usage ; ils ne furent pas plus étonnés lorsqu'ils apperçurent à son linge beaucoup de sang. Leur attention se borna seulement à savoir s'il sortait par la vulve ou non. ils en furent bientôt convaincus : ce qui leur fit croire que, puisque la Nature parlait si prématurément à leur fille, ils la verraient bientôt guerir de sa maladie de bouche ;

(a) je conclus de ces masses d'idatiodes et d'autres d'espèce différente qui font le sujet de quelques observations.

mais leur espérance fut trompée: car loin que cette évaluation suivit
la période ordinaire des règles, ^{elle} augmenta considérablement et jeta
la petite malade dans des faiblesses et synopes inquiétantes qui obligèrent
les parents à consulter. Ce fut en décembre 1775 que je fus appelé.
La petite Malade était au sixième jour de sa perte. par l'examen que
je fis de la bouche et du sang qui sortait des genèves; et par la comparaison
de celui ci avec celui qui s'écoulait par la vulve, je reconnus aisément
que cette hémorragie utérine était occasionnée par la dissolution de son
sang, et que la cause était florbutique: qu'il fallait la combattre par
des remèdes propres à donner plus de consistance aux fluides et plus
de ton aux solides: en un mot par les antislorbutiques; et que j'espérais,
par un traitement suivi, qu'en détruisant la cause, l'hémorragie
cesserait. on ne balança point à suivre mon conseil, et les remèdes
régulièrement administrés ne tardèrent point à produire leur effet et
annoncèrent un mieux marqué vers le troisième jour de leur usage.
L'hémorragie diminua de jour à autre, et fut entièrement dissipée au
bout d'un mois. Les genèves reprirent leur fermeté, se rapprochèrent
des dents chancelantes et recouvrent leur couleur vermeille: il ne
resta plus que de la bouffissure qui se soutint pendant le reste de
l'hiver et qui fut combattue par de légers purgatifs donnés de
tems en tems. La petite Malade, afin de rendre sa guérison plus
assurée, reprit au printemps les antislorbutiques qu'elle avait suspendus.

65. La fille d'un boucher de cette ville d'un tempérament sanguin
eut ses règles pour la première fois aux approches de sept ans,
et continua de les avoir périodiquement pendant cinq mois. Le
sixième mois, elle les eut pendant quinze jours avec assez
d'abondance sans qu'aucune cause connue eût pu produire
cette augmentation sinon la surabondance de sang pour quoi
elle fut saignée. Ce fut à cette époque que je fus consulté
au mois d'avril 1777. Cette jeune personne depuis la première
apparition de ses règles, était prise tous les mois aux approches de
son tems périodique de douleurs de tête assez fortes pour lesquelles
j'avais conseillé les bains de pieds et l'application des sangsues
au front après avoir évacué les premières voies par un vomitif, la
petite malade se plaignant de maux de cœur: j'avais même
proposé des bains entiers lors qu'on aurait eu mis en usage les
premiers moyens. quelques affaires ayant retardé l'évolution de

mes conseils, malgré que les parents fussent dans la meilleure disposition de les suivre. il s'était à peine passé trois semaines que cette petite fille fut prise tout à coup de violentes douleurs de tête de maux de cœur avec vomissemens de glaires terribles de sang; le visage ~~se~~ et tout le corps devinrent absolument rouges. L'hémorragie repartut alors d'une manière effrayante, et le sang qui coulait par la vulve annonçait bien son état inflammatoire, et ne laissait aucun doute sur sa surabondance. Déjà reconnue par l'inspection du visage et du corps de l'enfant. Les saignées furent fréquemment répétées, la diète soigneusement observée et les boissons les plus rafraichissantes et les plus délayantes entretenues dans le traitement ainsi que les lavemens. La diminution des accidens et de la peste suivit de près ce traitement. Le poulx devint dur et plein qu'il était, devint large et mou, et la détente générale des vaisseaux s'annonça par une abondante transpiration qui fit disparaître tous les accidens, et mit fin à la peste le huitième jour. La convalescence fut heureuse et la guérison prompte. Cette petite fille fut trois années sans recevoir les règles; mais elle ne fut pas à l'abri, surtout pendant les six à sept premiers mois qui suivirent cette hémorragie et vers le tems où elle avait coutume de les avoir, de douleurs de tête qui furent combattues par des bains et saignées de précaution. elle n'éprouva aulcuns des symptômes dont j'ai parlé jusqu'à onze ans tems où ses règles reparturent sans accidens, et elle a toujours continué d'être réglée et de jouir d'une bonne santé.



obs. au mois de xbre de la même année 1754 je donnai des soins à la fille d'un vannier d'orléans âgée de sept ans et demi d'une constitution faible et délicate qui était dans un cas d'hémorragie utérine. elle n'avait pas sept ans accomplis lorsqu'elle eut pour la première fois ses règles qui durèrent environ trois jours. il s'écoula six semaines de cette première fois à la seconde: il y eut à peu près autant d'intervalle de la seconde à la troisième fois: ensuite elle fut plus de quatre mois sans qu'on s'aperçut de rien. Les tems périodiques de cette petite fille s'annonçaient d'une manière assez singulière; le ventre se tendait sensiblement vingt quatre heures avant l'apparition de ses règles, et devenait si douloureux qu'elle ne pouvait supporter la présence d'un léger cataplasme: enfin le calme arrivait avec

L'évaluation périodique qui était toujours accompagnée d'un
devoirement de vingt quatre à trente selles dans le temps de
deux à trois jours; après quoi il n'était plus question de rien:
Mais il n'en fut pas tout à fait de même lors qu'elle voulut
avoir ses règles pour la quatrième fois, c'est à dire plus de quatre
mois après les précédentes: car les accidens s'annoncèrent dans toute
leur intensité. on eut de même recours au Cataplasme qu'on avait
mis en usage les autres fois, mais sans soulagement: on se décida
alors à me prier de vouloir bien la soulager. j'y fus, et je
trouvai cette petite fille dans l'état suivant. Le poulx était petit
et concentré, la respiration fort gênée, le ventre considérable^{ment}
élevé et très douloureux. Les parents M'ayant fait le récit de
tout ce qui s'était passé les précédentes fois, je jugeai à propos
de la saigner du bras; je conseillai qu'on donnât un demi
Laxement d'eau de mauve une heure après, qu'on lui préparât
un bain où elle resterait le plus long temps possible et la conti-
nuation du Cataplasme pour la reste de la nuit. Le lendemain
matin je la trouvai dans un très mauvais état, aucun des
remèdes n'avait procuré le moindre soulagement. je répétai
la saignée et je fis mettre les flanelles imbibées d'une decoction
émoliente après avoir frotté le ventre avec l'huile d'amandes
douces. un demi Laxement dans lequel entrait une once de la
même huile fut donné demi heure après la saignée; et le
bain ensuite. il était nécessaire d'alléger la détente afin
que le devoirement, qui dans tous les cas précédens avait été si
salutaire, se déclarât dans un moment aussi urgent: pour
cet effet je conseillai une potion huileuse dans laquelle on
aurait dissout deux grains de Kermes minéral dont on
donnerait une cuillerée toutes les demi heures. les choses étant
dans le même état à deux heures après midi du même jour, sinon
quelques mouvemens que la petite malade dit qu'elle sentait
dans le ventre, je la saignai pour la troisième fois et je la
fis remettre dans l'eau: enfin le devoirement se déclara dans
ce dernier bain où elle rendit une grande quantité de matières
d'une odeur insupportable. on la remit au lit et dans l'espace
de quatre heures elle ne cessa à chaque instant de se salir au
point que je fus étonné de la somme prodigieuse de matières que

cette petite fille avait rendu. Le poulx se développa et le mieux fut
marqué. je fis supprimer la potion huileuse avec le Kermes
minéral, et je conseillai qu'on lui donnât quelques bons bouillons
pendant la nuit. Le lendemain à ma visite on m'annonça
l'apparition des règles, mais avec abondance et on me fit voir
plusieurs draps qui étaient effectivement teints de bauloup de sang
et qui s'enfermaient bauloup de glalons. je m'assurai que le
sang sortait par la vulve et non par l'anus. la petite malade
perdit encore bauloup de sang pendant tout le jour, un peu moins
la nuit suivante et chaque jour fut marqué par la diminution
jusqu'au huitième jour où cette perte se termina. Le desvoiement
suivit la même période et s'arrêta le surlendemain. si je me suis
attaché à déterminer le desvoiement chez cette petite fille, et si je
n'ai fait administrer aucun Emmenagogue, c'est que le desvoiement
a toujours précédé les règles de quelques heures et qu'il semblait
être l'avant-coureur Nécessaire de l'évaluation menstruelle.
on voit dans les trois observations des phénomènes rares et frappants par
des causes qui, quoique différentes, ont eu pour but des hémorragies
utérines dont on pourrait tirer des conséquences physiologiques et
pathologiques en les considérant par rapport aux symptômes qui
les ont précédés



Le cours périodique des mois peut être interrompu chez les personnes
du sexe par quelques causes que ce soit, alors l'évaluation n'étant plus
soumise à la loi générale, la suppression détermine dans les
vires circulaires une surabondance d'où naît une foule d'altérations
auxquelles sont en proie les jeunes personnes qui les éprouvent jusqu'à
ce que la nature ait fait de nouveaux efforts pour rétablir le désordre.
il n'est pas toujours dans le pouvoir de la Nature de faire reprendre
au sang destiné pour cette évaluation la route ordinaire: il
s'en fait quelquefois une espèce de méastase dans des endroits fort éloignés
qui forcent et altèrent les vaisseaux où elle a lieu à lui livrer le passage
et dont le retour périodique suit l'ordre des règles par la voie ordinaire.
c'est ainsi que l'on voit des filles vomir tous les mois ou rendre par l'anus
pendant quelques jours une certaine quantité de sang: d'autres en perdent
avec le même période par le sein ou autres parties du corps. quoique
la somme de cette évaluation contre Nature soit ordinairement à peu
près la même de celle qui se fait naturellement, il arrive néanmoins
quelques fois qu'elle est portée à un tel excès qu'on peut la considérer comme

porte ou hémorragie. La fille girard de la paroisse de St aignan
d'Orléans âgée de vingt deux à vingt trois ans vomissait tous les mois plus
de quatre livres de sang. je lui en ai vu rendre par cette voie
quelquefois plus de six livres. cette évacuation périodique a duré plus
d'une année. La malade était à deux doigts de la mort pendant cette
crise, et le lendemain on la voyait dans les rues satisfait à son
appetit insister une livre et demi de pain pour chaque repas. quoique
le fait dont je vas parler ait du rapport avec celui ci étant déterminé
par la même cause; cependant il présente des phénomènes plus rares et
plus surprenants.

ob. Marguerite Boyard de Beaugenli petite ville éloignée d'Orléans de
six lieues âgée de dix huit ans et d'un fort tempérament eut ses règles
pour la première fois à dix ans et continua de les avoir régulièrement
tous les mois jusqu'à onze ans et demi tems où elle se supprimèrent
complètement à l'occasion d'une peur. ce fut à cette époque, au
rapport de quelques personnes dignes d'être crues, que les deux avant-bras
et les mains se gonflèrent avec chaleur et rougeur, et qu'après il s'y fit
un si grand nombre de petites ouvertures rondes qu'il ne fut pas possible de
les compter par où cette fille perdit plus de trois livres de sang; ainsi
que l'ont assuré les mêmes personnes. Depuis ce tems elle a été réglée
par les mêmes ouvertures; mais en moindre quantité jusqu'à treize ans: elle
fut ensuite cinq mois sans avoir cette évacuation; alors elle fut prise de
pâles couleurs pendant ce tems. Le flux périodique des avant-bras et
des mains reparut le sixième mois comme précédemment et continua
avec cette différence que tous les deux ou trois mois il se faisait une
pareille évacuation par les joues: alors celle des avant-bras et des mains
étaient diminuées. il arrivait aussi quelquefois que le flux avait lieu
tout le long de la partie antérieure de l'une et de l'autre jambe:
dans le cas celui des avant-bras et mains était très médiocre, et celui
des joues totalement supprimé. il en était de même lors que les joues
donnaient du sang, les jambes n'en donnaient pas; et lors que les
unes ou les autres en donnaient, les frais de l'évacuation étaient
communs avec les avant-bras et les mains: enfin le plus souvent le
sang sortait seulement des avant-bras et des mains. cette évacuation
n'était pas toujours modérée, je l'ai vue se porter à l'exès, et
je l'ai quelquefois évaluée au delà de quatre livres dans l'espace de
deux à trois jours. les petites ouvertures qui donnaient passage au
sang étaient bordées par autant de petits cercles qui s'élevaient au dessus
du niveau de l'épiderme; et dont le diamètre diminuait avec
l'évacuation pour former à la fin autant de petits cônes que l'on
pourrait aisément distinguer dans les endroits où ils n'étaient pas

en grand nombre. Cette jeune fille aux approches de ce flux
périodique perdait quelquefois connaissance: elle se portait assez
bien pendant le tems de l'évaluation; et elle vomissait du sang
vers la fin lorsque le flux périodique avait lieu par les avant-bras
et mains seulement ou par les avant-bras et les joues: mais elle n'en
vomissait jamais lorsqu'il se déridait par les jambes avec les avant
bras et les mains. Cette fille était entrée à l'hôtel-dieu d'Orléans
pour y être traitée de cet état contre nature: mais tous les moyens
reunis de la médecine et de la chirurgie les mieux indiqués que j'ai
mis en usage pour rappeler le sang vers la matrice, aucun
n'a réussi.

J'ai dit plus haut que la joie pouvait être une cause de pertes
chez les femmes enceintes: en effet si l'on fait attention au trouble
que cette affection de l'ame porte dans la machine animale lorsqu'elle
est excessive; on conclura sans peine que les effets peuvent en
être terribles. (a) Je rapporterai à ce sujet deux faits qui me
sont connus et dont les mères et leurs enfants ont été les malheureuses
victimes.



obs. La femme bidou de la paroisse de St Paul d'Orléans âgée de trente
deux ans et grosse de huit mois apprit par un bruit qui s'était répandu
dans le voisinage, que son mari avait été assassiné dans un voyage que
cet homme avait été obligé de faire par état. Cette femme se livra
à toute la tristesse dont est capable une femme qui aime tendrement
son mari; mais il ne s'en suivit aucun accident fâcheux pour elle
ni pour l'enfant qu'elle portait pendant quinze jours de pleurs et
de chagrins que ses amies tâchaient d'adoucir par leurs fréquentes visites:
lorsque tout à coup et au moment qu'elle s'y attendait le moins, vers le
soir, le mari, n'étant point prevenu du faux bruit qui avait
couru dans le quartier, se presenta à sa femme. Elle si fautive
ne put donner essort à la joie excessive qu'elle éprouva à la vue
de son mari et qu'elle manifesta par différents mouvemens au sujet
de quelques personnes s'assis qui se trouvaient à cette scene tragique:
elle voulut parler; mais elle ne le put. Ses yeux restèrent fixés sur son
mari et des lors la respiration devint laborieuse, les membres se contor-
naient et le corps se roidit: enfin elle resta dans cet état terrible
de spasme qu'on appelle tetanos. on n'avait point encore porté
cette femme sur son lit lorsqu'on s'aperçut qu'elle perdait beaucoup
de sang; ce qui détermina à faire appeler quelqu'un de l'art. un
(a) il y a grand nombre d'exemples de morts subites par l'excessive joie.

étudiant en chirurgie qui se trouva le premier auprès de cette malheureuse lui donna les soins qu'il crut les mieux indiqués en pareil cas: il fit une saignée de bras et mit sur le ventre des linges mouillés de vinaigre; mais tous les moyens furent sans effet. La peste redoubla, quelques convulsions parurent et la mort suivit de près. Ce jeune chirurgien assuré de la mort de cette femme, tourna ses vues du côté de l'enfant. En cas qu'il ne fut pas encore mort, il proposa l'ouverture de son corps avant que je fusse arrivé: il vint à sa demande devant moi. Cette femme étant tellement morte, j'insistai sur son avis; mais les parents étonnés d'une mort si prompte, et s'imaginant qu'elle pouvait être dans une léthargie profonde, ne consentirent à cette opération qu'à condition qu'elle ne serait faite que le lendemain. L'ouverture de cette femme fut faite douze heures après sa mort le 16 août 1779. La matrice qui était au plus haut degré d'inflammation renfermait un caillot de sang coagulé au milieu duquel se trouva l'enfant entièrement détaché et appuyé sur l'enfant enveloppé de ses membranes. il était couché présentant le dos à l'epine de la mere: sa tête répondait au côté droit du bassin et son derrière au côté gauche.

Obs. au mois d'avril 1782 étant allé à bré village éloigné d'Orléans de douze lieues, j'appris qu'une femme des environs âgée de 26 à 37 ans — ayant eu plusieurs enfants dont elle était toujours très heureusement allaitée, venait de périr avec son enfant au huitième mois de sa grossesse par une perte considérable dont on attribuait la cause à une joie excessive à l'occasion d'un procès qu'elle avait gagné depuis quelques jours; et qu'un chirurgien devait en faire l'ouverture le lendemain. Cette femme, m'a-t-on dit, du moment qu'elle apprit le gain de sa cause, trois à quatre jours avant son accident, perdit pour ainsi dire la tête, n'ayant toujours, allant de tous côtés et annonçant à tous les passants la réussite de son procès: elle ne prenait de nourriture que lorsqu'on l'y obligeait, et ne connaissait plus le sommeil. Je relis d'un fait aussi extraordinaire que celui-ci, fit naître en moi le desir de prendre une connaissance plus directe de cet événement. Je ne le dissimulai pas: aussitôt quelqu'un d'obligeant s'offrit à me conduire sur le lieu qui était à une petite lieue de l'endroit où j'étais, et à faire avertir le chirurgien que je desirais me trouver à l'ouverture de cette femme. On convint de l'heure et chacun fut exact à s'y rendre. L'entretien que j'eus avec ce chirurgien fut sur les premiers allaitemens de cette femme pour savoir de lui s'il n'avait point remarqué en elle quelques symptômes

De vapeurs soit quelle fut grosse ou non. il m'assura avec quelques personnes qui étaient présentes qu'on ne s'était appelé de rien: enfin je lui fis le détail du récit qu'on m'avait fait, et je lui demandai si il était véritable. il me l'assura de même ajoutant qu'il avait eu occasion de voir cette femme dans le commencement de sa perte pour la quelle il l'avait saignée du bras: qu'il avait conseillé qu'on lui couvrit le ventre de linges mouillés dans beau froid, que la perte avait diminué et qu'il s'était retiré avec promesses de revenir sitôt que la sage femme le croirait nécessaire: qu'enfin il avait appris avec étonnement la mort de cette femme; et qu'il avait été sollicité par les parents à en faire l'ouverture. la sage femme qui était présente me dit ensuite que la perte avait été abondante pendant les six premières heures de l'absence du chirurgien; que pendant ce tems les douleurs s'étaient déclarées, que la matrice s'était ouverte de plus en plus: qu'enfin elle l'était absolument et la perte presque disparue, lorsque cette femme est tombée dans de fréquentes faiblesses et qu'elle est morte. Le chirurgien ayant fait l'ouverture de cette femme nous ne trouvâmes dans la matrice que très peu de sang coagulé. l'enfant n'était plus en forme dans ses enveloppes: sa tête était appuyée sur le pubis gauche de la mere, le dos sur l'os des iles du même côté et le siège élevé vers la colonne vertébrale: En un mot le placenta était attaché à la matrice par plus de la moitié de sa surface.

il résulte de ces deux observations que le mal était sans remède chez la femme qui fait le sujet de la première. la perte n'a pas duré deux heures, ~~la matrice~~, la matrice n'a aucunement travaillé à la dilatation de son orifice et le placenta était totalement détaché de l'utérus. il n'en était pas de même chez celle qui fait le sujet de la seconde observation. la perte a duré près de vingt quatre heures, le travail de la matrice s'est annoncé par des douleurs; elle s'est suffisamment ouverte, le sang s'est écoulé et le placenta n'était décollé qu'en partie: cette femme était donc dans le cas d'être secourue. un accoucheur intelligent aurait saisi toutes les indications favorables qui se présentaient: il aurait ~~fait~~ fait l'accouchement forcé et il aurait, je crois, pu sauver la mere et l'enfant.

De l'attache du placenta au col de l'utérus ou sur son orifice, et de la nécessité de faire l'accouchement forcé dans les cas de pertes en conséquence de son décollement.

il n'est point d'endroits dans l'uterus où le placenta ne puisse s'implanter. Cette vérité a été approuvée par plusieurs auteurs, révoquée en doute par d'autres, et mise au jour d'une manière si évidente par mon livre, qu'elle est incontestable aujourd'hui et généralement reconnue. Cet accoucheur célèbre n'a pas voulu ses recherches à connaître et à prouver que le placenta pouvait se fixer dans tous les points de la surface intérieure de la matrice; il en a tiré des conséquences justes et de la plus grande utilité pour les accouchemens. Dans quelque endroit de l'uterus que le placenta ait pris racine, il peut en être détaché totalement ou en partie pendant la grossesse par quelques unes des causes dont j'ai parlé, et déterminer une perte plus ou moins grande en proportions des parties de la matrice qu'il a abandonnées; mais lorsque le placenta s'est implanté sur le bord ou sur la totalité de l'orifice utérin, il doit nécessairement s'en détacher avant l'accouchement; et la perte qui résulte de son détachement met toujours la mère et l'enfant en danger de perdre la vie si le chirurgien ne fait pas promptement l'accouchement forcé. Il était réservé à mon livre de nous donner une théorie aussi lumineuse sur les caractères distinctifs des pertes qui arrivent pendant la grossesse soit que le placenta se soit détaché du fond de la matrice, soit qu'il se soit détaché des parois internes de son corps, soit enfin qu'il se soit séparé du col de cet organe plus ou moins près de son orifice, ou de toute sa circonférence. Il met en évidence la cause primordiale de cette espèce de perte, établit les signes qui la font connaître et différencier des autres; et il nous offre un moyen sûr de sauver les mères et leurs enfants, en ne mettant aucun délai à l'accouchement forcé; d'après sa méthode et la manière de se comporter en pareil cas. Ce faisant accoucheur, en combattant et détruisant à fond le sentiment de desintéressement et de son zèle partisan sur l'attache du placenta toujours au fond de la matrice rapporté à ce sujet nombre d'observations qui appuient le sien et qui prouvent que le placenta peut s'implanter dans tous les points de l'intérieur de cet organe; et il fait dépendre les différentes obliques plus ou moins grandes de l'uterus, de l'attache de l'arrière-faix plus ou moins éloigné du centre du fond de la matrice. on voit dans une dissertation sur le poulx de grossesse que je fis passer au journal de médecine en 1773 que l'attache du placenta aux parties latérales de la matrice ne m'était point inconnue. — Voilà comme je m'explique pag. 538. ne sachant à quoi attribuer ce défaut de vérité, j'en cherchai la cause; et je crois l'avoir trouvée dans le poulx d'avant grossesse, dans la situation de l'enfant, la culbute étant faite, et dans l'attache du placenta. plus loin pag. 542 enfin, dans l'attache du placenta, mes recherches furent telles que je touchais les deux bras des personnes, à qui je connaissais le

poulx à peu près égal, Depuis le quatrième mois de la grossesse jusqu'au
 huitième; si pour lors je trouvais le poulx du bras droit plus fort, je
 soupçonnais le placenta attaché à gauche dans la matrice; je
 soupçonnais le contraire lorsque je trouvais le poulx radial gauche
 plus élevé: la suite vérifiait mes prédictions, et j'ose dire ne m'être
 pas trompé une seule fois. Lorsque le poulx des deux bras était égal,
 c'est que l'arrête-faix n'inclinait pas plus à droite qu'à gauche, ce
 dont je pouvais m'assurer par l'orifice utérin dès les premières fois
 que je touchais les femmes en travail. et plus bas: pour ce qui est du
 placenta, ne pourrait-il pas contrebalancer l'enfant qui inclinait
 vers le côté opposé à son attache. (a) il est donc de fait que la
 perte s'annonce plus ou moins promptement dans les derniers mois de
 la grossesse, et quelle sera plus ou moins grande et dangereuse lorsque
 le placenta implanté plus ou moins près de l'orifice de la matrice ou
 sur lui même, s'en sera détaché. je t'apporterai à ce sujet quelques
 exemples qui, sans prétendre à la nouveauté, prouvent l'excellence des
 ouvrages de Mr Levret. tous les auteurs qui ont écrit sur les pertes qui
 arrivent aux femmes vers les derniers mois de leurs grossesses sont unanimement
 d'accord de faire l'allouchement forcé dans les cas de pertes considérables
 où la vie des mères et des enfants paraît être en danger. Mr Puzos
 était convaincu de cette nécessité; mais considérant que parmi les femmes
 qui avaient été soumises à l'allouchement forcé, il en périssait beaucoup
 après l'allouchement par la continuation de leur pertes, crût devoir
 chercher, dans les différentes façons de pratiquer les allouchemens de
 nécessité, une méthode qui les rendit moins dangereuses. Cette méthode
 qui tient le milieu entre l'allouchement naturel et l'allouchement forcé,
 et où la nature et l'art se servent mutuellement, a été suivie du succès
 le plus heureux. ce moyen tout excellent qu'il est, lorsque le placenta
 s'est en partie détaché du fond de la matrice ou de quelques unes des
 parois de son corps qui ne seraient pas éloignées du fond, serait
 dangereux si l'arrête-faix avait commencé à se détacher des environs
 de l'orifice de l'utérus: car dans le dernier cas si l'on tentait
 la méthode de Mr Puzos, loin d'obtenir le succès qu'on se faisait
 proposer, on ne manquerait point d'exposer au plus grand danger la mère
 et l'enfant par la perte de leur sang qui, au lieu de diminuer, augmenterait
 par le décollement plus étendu du placenta, et faciliterait la sortie
 du sang par un plus grand nombre de vaisseaux. la méthode de Mr Levret
 est donc préférable en pareille circonstance, et doit être mise en usage
 le plus promptement possible.



obs. au mois de juil 1776 je fus appelé à chateaufort village éloigné d'Orléans de six lieues pour secourir même grivot qu'une de sept mois qui était depuis trois jours dans une grande perte qui, loin de diminuer par les secours que lui administraient les chirurgiens de l'endroit, augmenta au point de jeter l'allarme. Les faibles qui se fussent de près firent craindre pour sa vie et pour celle de son enfant si on ne se prenait de la secourir. La difficulté de trouver une voiture à cause du grand nombre de personnes qui vont et reviennent de la campagne dans cette saison, apporta un retard de six à sept heures à mon arrivée. Le délai était bien long suivant le tableau qu'on m'avait fait: il y avait même lieu de croire que je la trouvais morte; cependant elle ne l'était pas: mais je la trouvais sans mouvement, la voie presque éteinte, le visage pâle et plombé et le pouls si petit et si languissant qu'elle me parut sans espérance. elle avait été administrée. je portai un doigt dans le vagin pour reconnaître l'état de la matrice; mais n'ayant pu rencontrer son orifice au travers de broussailles de sang coagulé, j'y portai la main; et après avoir fait sortir toute cette masse de sang, je reconnus que la dilatation déjà bien avancée, qu'elle n'eut eu que de très petites douleurs pendant les deux premiers jours qui disparurent le troisième jour, était fermée par une masse charnue que je reconnus pour être le placenta qui s'avançait un peu dans le vagin. De ce côté qui était le gauche la matrice était bien amincie tandis qu'elle formait un bourlet épais du côté opposé. ayant donc suffisamment détaché avec mes doigts le placenta du côté gauche, et ayant ouvert les membranes j'entrai avec assez de facilité dans la matrice où je trouvai l'enfant qui je tirai vivant par les pieds. pendant le travail la perte augmenta: néanmoins la malade la soutint et fut promptement délivrée. la perte diminua sensiblement, et on fut obligé à l'appeler ses forces. l'un des chirurgiens qui étaient présents se chargea de la soigner pendant la nuit. le lendemain matin je la trouvais assez bien et fut les dix heures je permis une petite soupe. la suite de couche a été si heureuse, qu'elle a été rétablie en trois semaines. son enfant a vécu quarante huit heures.

on voit par ce que j'ai de dire que la plus grande partie du placenta occupait la partie latérale droite du col de l'utérus, et la plus petite le reste de la circonférence de l'orifice. d'où l'on peut tirer les conséquences pourquoi la matrice était plus amincie à gauche et pourquoi son travail était plus avancé de ce même côté. il n'en était pas de même chez la femme qui fournit le sujet de cette 2^e observation. le placenta s'était implanté également sur toute la circonférence de l'orifice utérin: aussi le travail de la matrice se fit il au dépend de sa partie centrale et mit, en très peu de temps, la mère et l'enfant dans le plus grand danger.

obs. M^{me} malade grande et d'une forte constitution avait eu plusieurs enfants dont elle était accouchée très promptement et sans le moindre accident. elle passa

les sept premiers mois de la grossesse dont il est ici question dans le meilleur état possible; mais vers la fin du huitième mois elle commença à perdre du sang dont elle ne s'affected pas pendant quelques jours: cependant le mari inquiet par la situation extraordinaire de sa femme, me consulta. j'allai la voir. je lui conseillai de garder le lit et de se faire soigner plutôt deux fois qu'une; elle le fit; mais le sang continua de donner qu'une petite quantité jus qu'à la moitié de son neuvième mois. ce fut à ce terme que la perte augmenta tout à coup par quelques douleurs qu'elle avait éprouvées et devint si violente qu'en moins d'une heure cette femme perdit une quantité si prodigieuse de sang qu'elle allait jusqu'à l'étonnement. à mon arrivée elle me demanda ce que cela signifiait. je lui répondis que je le lui dirais lorsque je l'aurais touchée. les douleurs étaient devenues de plus en plus fortes, et le travail de la matrice avait produit son effet sur son orifice: la dilatation était de la grandeur d'un œuf de six livres bœuf tout autour par un bourlet fort épais qui pressait de toutes parts une tumeur que je reconnus être le placenta. j'annonçai aussitôt à cette femme qu'il fallait que je l'allouchasse sur le champ, que c'était le seul moyen de lui sauver la vie et celle de son enfant, et qu'il n'y avait point de tems à perdre. elle se soumit à tout en me témoignant la plus grande confiance: et je fis l'allouchement fort de la manière suivante. ~~immédiatement~~ après avoir suffisamment détaché le placenta de la circonférence du bourlet de la matrice qui cedait à la pression de mes doigts, je perçai à peu près dans le centre de la tumeur qu'il formait, et malgré quelque résistance que j'éprouvai de la part des membranes qui se trouvaient opposées près la naissance du cordon, je pénétrai dans la matrice pour chercher les pieds de l'enfant que je trouvai fort éloignés: et je les tirai ainsi fort promptement et allouchement. l'enfant était vivant et malgré sa faiblesse excessive, il se releva ses forces en peu de jours et a continué de vivre. les suites de couches ont été assez heureuses et n'ont duré qu'un mois.

que les pertes chez les femmes grosses soient excessives ou de longue durée, quelles jettent le trouble dans l'économie animale de celles qui les éprouvent jus qu'à déterminer des faiblesses plus ou moins grandes, des convulsions; quelles mettent dans le plus grand danger les mères et leurs enfants ou les fassent périr: tous ces accidens sont connus et n'arrivent malheureusement que trop souvent. mais qu'une femme prise d'une perte considérable tombe dans une l'éthasie spasmodique, si je dois nommer ainsi l'état où elle était; et y reste pendant trois jours, je crois ce fait rare et extraordinaire, et j'en ai lu nulle part d'exemple pareil à celui-ci: c'est cependant ce qui est arrivé à la femme meunier de la paroisse de St pierre le puellier d'Orléans. cette femme âgée de quarante trois ans, d'une taille moyenne et d'une faible constitution ayant eu plusieurs enfants dont elle était bien allouchée, s'appesantit vers la fin du neuvième mois de cette nouvelle grossesse, qu'elle perdait du sang

quoiqu'elle n'ignourât que quelques légères douleurs de tems à autre: —
neammoins elle fit appeler une sage femme. Le commencement de perte
dura dix jours; mais parvenue au tems où la matrice travaille à faire
sortir le fardieu qu'elle renferme, les douleurs augmentèrent vivement
et chaque contraction de la matrice à chaque contraction versait des flots
de sang. la sage femme effrayée annonça la nécessité la plus pressante de
recourir à un chirurgien: elle le fut bien plus encore lorsqu'elle vit paraître
des convulsions, des faiblesses, et qu'elle ne put tirer une seule parole de cette
femme. on courut à l'église et on lui administra l'extreme onction. je
n'arrivai qu'après. on me dit qu'elle était mourante, et que l'on ne voyait
pas qu'elle fut dans le cas d'être secourue: En effet elle était pâle et
défaite, le visage et les extrémités froides, sans mouvemens, sans parole
et presque sans pouls: je dis presque sans pouls, car les battemens étaient
si petits et si éloignés, qu'il y avait tout lieu de croire qu'elle avait
peu de tems à vivre. Le cas était grave, la circonstance périlleuse
et la nécessité très douteuse; neammoins je crus devoir tenter le dernier
moyen. je dis à deux personnes de lui faire des frictions avec des linges
mouillés dans un mélange d'eau de vie et de vinaigre, l'une sur la région
du coeur et de l'estomac tandis que l'autre lui frotterait les tempes et
lui faisait respirer cette liqueur, et de continuer ce travail pendant
que je faisais l'accouchement forcé. je débarrassai le plus promptement
qu'il me fut possible tout le sang coagulé qu'elle avait entre les cuisses et
dans le vagin où je trouvai une grosse portion du placenta qui s'était
détaché du côté gauche de la matrice dont l'orifice me parut effalé
de ce côté. Le bain s'était éloué par la rupture des membranes —
determinée sans doute pendant le tems des douleurs; et cette partie de
l'arrière-faix n'étant plus retenue du côté gauche, s'était prolongée assez
avant dans le vagin. j'entrai avec facilité dans la matrice et je
terminai l'accouchement par les pieds. je conseillai la continuation des
mêmes frictions, et de les étendre sur le bas ventre jusqu'aux pubis afin
de tirer la matrice de l'inertie absolue où elle était et de produire plus
promptement son renferment qui devenait alors le seul moyen pour
arrêter la perte qui coulait encore trop en raison du peu de forces qui
restaient à cette malade. elle diminua effectivement peu à peu et fut
réduite à beloulement ordinaire des lochies. Malgré cet avantage du côté de
la matrice, le pouls était aussi misérable qu'avant l'opération. je lui fis
flaïter de l'eau de lule; elle y parut insensible. j'essayai si la deglutition
se faisait en versant dans la bouche un peu de vin chaud sucré; elle
l'avala: ce qu'on répéta souvent avec le même succès. Comme il était
fort tard, et que j'avais besoin de repos, je me retirai après qu'on m'eut
bien promis de suivre mes conseils qui furent de continuer pendant la
nuit de la nuit à différentes reprises les frictions avec l'eau de vie
seulement; de lui faire prendre souvent et par cuillerée du vin d'alicante

et du bouillon; et de lui faire flâter la liqueur spiritueuse. je retrouvai cette pauvre femme le lendemain matin à peu près dans le même état. c'est à dire sans mouvemens et sans parole; le pouls était aussi faible, mais ses pulsations étaient moins éloignées. le ventre était mollet et la matrice ne formait plus qu'un peu d'élevation du côté droit. les suindanges coulaient fort peu. je lui fis mettre aux pieds de la fiente de Moutarde pilée et imbibée d'un tiers d'eau ordinaire et deux tiers d'eau de vie: au reste le traitement précédent fut suivi et j'ordonnai une potion cordiale dont on donnait une cuillerée toutes les heures. je la revis vers le soir: son état étant le même, je plaçai deux vésicatoires aux jambes non dans la vue de déterminer la supuration; mais comme toniques et stimulans. le matin du second jour, je trouvai le pouls plus soutenu et ses battemens approuchoient de l'état naturel. je portai deux autres vésicatoires aux bras et je fis renouveler le fignapisme des pieds. le soir approula quelques changemens: elle commença à remuer les bras et les jambes et tournait la tête lorsqu'on lui présentait la liqueur spiritueuse. elle avait pris ce jour-là beaucoup de bouillon à la faveur d'une cuiller à bec. le troisième jour il y eut un mieux bien marqué; plus de liberté dans ses mouvemens: et vers le soir elle commença à balbutier quelques mots. tous les jours suivans le mieux augmenta et en peu de tems elle recouvra l'entière liberté de ses membres et de la parole: mais il ne lui resta aucun souvenir de son accouchement, et elle ne put croire qu'elle était accouchée que lorsqu'elle se fut touché le ventre et qu'on lui eut présenté son enfant. on fera sans doute compte de revoir sur la place son enfant vivant: il est bien vrai que je l'ai crû mort pendant plus d'une heure malgré tout ce qu'on put faire; mais à force de soins et de moyens employés il fut rappelés à la vie. il a continué de vivre et la mère s'est parfaitement rétablie avec le tems. ce dernier exemple et les deux précédens prouvent incontestablement qu'on ne doit point abandonner une femme en pareil cas. lors même qu'elle paraîtait toucher au dernier terme de sa vie, et que la nature a des ressources quand elle est sollicitée par l'art.

Les femmes qui quelque heureusement accouchées, ne sont point à l'abri des pertes qui suivent quelquefois immédiatement leur accouchement. la matrice ayant perdu son ressort, reste dans l'atonie: alors les vaisseaux utérins, n'étant point resserrés, offrent au sang une issue libre. m^{me} le vacher de la paroisse de St Julien le puellier d'orléans fut à deux doigts de la mort par cette espèce de pertes et je ne l'ai sauvée qu'à force de soins. une dame benoît aussi d'orléans accouchée en très peu de tems et heureusement perdit en présence de son chirurgien. des faux germes qui compliquent quelquefois les grossesses, peuvent aussi déterminer des pertes. j'ai vu une femme en rendre jusqu'à trois les premiers jours qui suivirent son accouchement: enfin des portions de délivres, des délivres entières restées dans la matrice, causent des pertes quelques fois mortelles. la femme d'un boucher de cette ville fut très heureusement accouchée. son chirurgien en essayant de la délivrer, le cordon cassa près de la matrice: il voulut introduire sa main dans la matrice; la femme s'y refusa absolument et résista à toutes les sollicitations possibles: elle brava le danger où elle s'exposait si on ne la délivrait pas: elle préféra même la mort qui arriva le troisième jour par la perte de son sang.

Je reviens au sujet de ma quatrième observation. on lit dans les ouvrages de
 Mr Levret (a) que le Docteur Jenson, voulant détacher un placenta adhérent à la
 matrice, le trouva renfermé seul dans une poche bien distincte: on y lit aussi
 que Mr Jenson donne plusieurs exemples de ce fait qu'il parait faire dépendre d'un
 défaut de la matrice dès la première conformation. Mr Levret renvoie pour une
 plus grande quantité de ces faits écrits à la chirurgie d'Heister et au nouveau
 Dictionnaire de médecine; il se contente d'ajouter deux faits dont l'un lui a été
 communiqué par un deses confrères et l'autre lui est propre. Le premier est de
 Mr Coste qui a trouvé le délivre renfermé dans un replis de la matrice comme
 dans une espèce de bourse. Le second qui appartient à Mr Levret approche plus
 de celui dont je parlerai dans un instant. Le fœtus allouché a reconnu que
 cet orifice allongé était exactement rond et du diamètre de deux poises ou
 environ, que son bord était comme tendineux et qu'il résistait à l'introduction
 des doigts: il ajoute ensuite qu'ayant porté une seconde fois sa main dans
 la matrice, il avait trouvé l'orifice allongé à peu près le même; mais le
 fœtus bien moins spacieux; et qu'ayant touché cet orifice une troisième fois, le
 fœtus ne formait plus qu'une espèce de chalon qui n'avait pas un demi doigt
 de profondeur. Mr Levret ayant allouché deux fois cette dame depuis, et
 cette cellule ne s'étant point présentée à ses recherches, conclut qu'elle était
 allongée, et qu'elle ne provenait point de la première conformation: enfin
 qu'elle n'avait point été oblitérée par des mouvements convulsifs. Le fait que
 je présente était absolument pareil à celui-ci si l'orifice de la cellule n'eût
 pas été plus étroit, s'il n'eût pas offert plus de résistance à mes doigts et si la
 femme n'eût pas perdu beaucoup de sang.

obs. au mois d'octobre 1782 je fus appelé par un chirurgien pour secourir
 la femme vaillante de mardie à trois lieues d'Orléans qui était depuis environ
 trente heures dans une perte assez grande en conséquence du passage de l'enfant
 dans le ventre par rupture de la matrice; et de me munir, ajouta-t-il dans
 sa lettre; des instrumens nécessaires pour faire l'opération Césarienne. En
 effet lorsque j'entrai chez cette femme j'apportai une table couverte de linge
 préparé et de charpie. Je demandai alors à ce chirurgien quelles étaient les
 raisons qui l'avaient pu décider à cette opération, et sur quoi il avait appuyé
 son jugement. Il me répondit qu'ayant allouché cette femme d'un enfant,
 il avait tenté de la délivrer ce qu'il n'avait pu par la trop grande résistance
 qu'il avait éprouvée en tirant sur le cordon: qu'ensuite ayant entre sa main
 dans la matrice pour y chercher la masse, il avait trouvé une ouverture à
 la matrice par où un fœtus enfant avait passé dans le ventre; que
 d'ailleurs en touchant le ventre de ce côté-là, on sentait distinctement l'enfant
 et que l'on distinguait même ses côtes et qu'en outre je serais entièrement con-
 vaincu de cette évacuation en suivant le cordon. Il est bien vrai qu'un tel
 raisonnement n'était point une conviction pour moi et bien moins encore
 lorsque je me fus fait présenter l'enfant qui était fort gros. M'étant approché
 de cette femme qui était au lit, et lui ayant pris le bras, je lui trouvai
 le pouls assez bien; mais faible par laquelle elle avait perdu beaucoup de
 sang: son visage était pâle à la vérité; mais elle n'avait rien perdu
 du côté des sens; de là je passai à l'examen de la tumeur: elle était au
 côté droit de la matrice et on la sentait distinctement ainsi que des

inégalité qu'elle présentait. je dis à le chirurgien que j'étais fort éloigné de croire qu'il y eut un second enfant passé dans le ventre; mais que je croyais bien que l'ovaire faux était arrêté vers la corne droite de l'utérus, que le serrement de cet organe ayant formé un replis sur lui était la cause de la résistance qu'il avait éprouvée, et que la perte était occasionnée par le décollement de quelques unes de ses parties. je portai la main dans la matrice en suivant le cordon qui me servait de guide, j'arrivai à la prétendue crevasse où je fus arrêté avec étonnement: car au lieu de rencontrer un replis, je trouvai un second orifice utérin, un anneau qui pressait de toutes parts le cordon et dont la circonférence avait acquis une telle solidité qu'il me fut impossible pendant quelques minutes d'y introduire un de mes doigts. Cette rencontre était nouvelle pour moi: il fallut donc dilater ce nouvel orifice et vaincre la résistance qu'il offrait à mes doigts. Ce ne fut qu'après quelques minutes que je parvins à faire passer le premier de mes doigts qui commença la dilatation en comprimant l'anneau; j'en introduisis deux, ensuite trois et avec le temps je dilatai suffisamment pour y passer la main. j'entrai dans cette loge qui était remplie de sang coagulé que je fis sortir: alors je m'emparai de la masse du placenta et l'ayant éloigné de l'endroit du bas ventre où elle faisait tumeur, je dis à le chirurgien de toucher le ventre dans cet endroit; il fut fort surpris de n'y rien trouver: je lui fis ensuite toucher la tumeur telle qu'auparavant. Le placenta était détaché dans le tiers supérieur de sa surface. Le reste était très adhérent. L'ayant détaché du fond de cette loge, et l'ayant conduit et engagé dans son détroit avec les doigts, je le fis sortir entier à la faveur du cordon sur lequel je tirai avec la main gauche tandis que la droite restait pour entraîner avec elle les restes de sang coagulé: ce qui termina cette opération. Si j'avais connu les observations de Mr Levret, j'aurais été bien à portée de rentrer dans la matrice autant de fois que je l'aurais jugé nécessaire et de suivre les progrès de la destruction de cette cellule et de son orifice; car cette femme le demandait dans la crainte qu'elle avait qu'il n'y restât quelque chose: mais je la rassurai et je ne le fis pas. Les trente heures de délai pour l'extirpation du placenta et la perte qui a duré le même temps n'apportèrent aucun retard au prompt rétablissement de cette femme. je termine ici ce que j'avais à dire sur les différentes pertes que j'ai eu à traiter, sur leurs causes et sur les moyens que j'ai mis en usage pour m'occuper d'autres objets en matière d'accouchemens.



Sur une grossesse trompeuse

Les signes ordinaires de la grossesse tels que les maux de cœur, les vomissements, la disparition des règles &c. en imposent souvent et font croire à certaines femmes qu'elles sont grosses lorsqu'elles ne le sont pas. par des signes contraires; celles qui n'éprouvent point les premiers symptômes et qui n'ont point discontinué d'être réglées avec régularité dans la période et dans la quantité pendant quelques mois, croient ne l'être pas quoiqu'elles le soient réellement. Mrs Morileau et Lagnette ont traité cette matière

Mr Puzos donne pour signe certain, lors qu'il est question de toucher une femme, la correspondance que doit avoir la matrice entre les deux Mains de celui qui la touche dont l'une serait posée sur le ventre au dessus des pubis tandis qu'un doigt de l'autre toucherait l'orifice utérin en poussant alternativement l'une contre l'autre; mais ce signe ne prouve pas si la matrice renferme un enfant ou un corps étranger. Mr Levret toujours fidèle observateur a traité à fond les signes qui font connaître la vraie et la fausse grossesse. il n'est donc point rare qu'une femme ait ses règles pendant les 2. 3. et 4 premiers mois de sa grossesse; alors assez communément la quantité n'est pas la même: mais qu'une femme les ait eues pendant tout le tems de sa grossesse sans dérangement dans le période, et sans augmentation ni diminution dans la quantité, qu'elle n'ait éprouvé auluns symptômes de grossesse, sinon une malaise générale, que son ventre n'ait point paru grossir: enfin qu'elle n'ait jamais senti le moindre mouvement dans son ventre: — qu'ensuite elle soit accouchée d'un enfant qui tenait le milieu entre les gros et les petits enfants, et que cet enfant soit très vif: le phénomène faisait des plus rares si toutes les circonstances qui l'accompagnaient étaient véritables.

obs. quoiqu'il en soit il est certain que la femme Tousseau de la paroisse de St Donatien d'Orléans a eu ses règles pendant tout le tems de sa grossesse, — qu'elles n'ont point été diminuées ni augmentées; et qu'elles ont suivi le même période: je peux ajouter que je n'ai point aperçu d'augmentation sensible de son ventre: enfin chaque fois qu'elle me consultait, elle m'assurait qu'elle ne sentait auluns mouvemens on elle qui eussent du rapport à la grossesse. Cette femme était d'un tempérament bilieux mélancolique et s'était mariée à 45 ans. elle s'imaginait avoir des obstructions et me demandait sans cesse des remèdes pour les détruire quoique je ne voulusse lui en conseiller auluns. La femme Tousseau après avoir consulté plusieurs medelins, s'adressa à un empirique qui ^{lui dit} ~~assura~~ qu'elle portait un fœtus, et qu'elle mourrait lorsqu'elle le rendrait. Le tems venu où l'accouchement se décide, cette femme éprouva quelques douleurs dans le ventre; mais n'ayant point oublié ce que l'empirique lui avait dit, elle voulut absolument mettre ordre à ses affaires tant pour le spirituel que pour le temporel: ce qu'elle fit sur le champ: elle témoigna ensuite à son mari qu'elle désirait me voir avant de Mourir. j'y fus et en arrivant à son lit, je m'aperçus qu'elle avait le visage monté en couleur contre son ordinaire, et qu'elle était dans un état de contrainte: je lui touchai le bras pour savoir si cette couleur provenait de fièvre. pendant ce moment le calme arriva; elle en profita pour me dire en deux mots qu'elle touchait au dernier moment de sa vie, et qu'elle allait rendre le fœtus qu'elle portait. Lui ayant annoncé qu'il fallait que je la touchasse; je posai une main sur le ventre et de l'autre je la touchai. une douleur se parut sur le champ; l'orifice utérin était entièrement effacé et les membranes gonflées par les eaux que la matrice pourrait former dans le vagin. je ~~différai~~ différai de faire écouler le Bain voulant m'assurer avec la main que j'avais laissée sur le ventre si je ne remarquais pas quelques mouvemens de la part de l'enfant. je n'en sentis auluns. une troisième douleur suivit de près,

rompit les membranes : La tête de l'enfant s'engagea et l'accouchement fut promptement terminé. La femme d'oursseau reçut avec plaisir l'échange et trouva la métamorphose ~~de~~ fort agréable. L'enfant était, comme je l'ai dit de grosseur moyenne et fort vif.

Si les apparences sont trompeuses chez les femmes; elles ne le sont pas moins chez les filles : Le soupçon reste quelque fois, et leur réputation flétrie les rend victimes de leur malheureux état.

obs. Je rapporterai ici deux faits. Le premier est d'une petite fille de douze ans qui ayant été déposée à l'hôpital général d'Orléans, fut soupçonnée grosse; et fut transférée de là à l'hôtel-dieu à l'effet d'y être visitée; et dans le cas de grossesse, y faire ses couches. Cette petite fille me fut présentée: elle portait un ventre d'un volume très gros, fort dur vers les pubis et étendu sur les côtes: elle ajoutait à cette circonstance qu'un homme l'avait renfermée dans une orange et qu'il avait joui d'elle; elle entra même, sur le dernier point, dans le plus grand détail: et dit que c'était depuis le temps que le ventre lui avait grossi. On se borna à l'examen du ventre et on remit à un autre temps l'examen plus sérieux de cette petite fille. L'administration M'ingagea de nouveau à prononcer sur l'état de cette petite: je la visitai donc et je reconnus qu'elle n'avait point été déflorée, et que la matrice ne renfermait rien; mais qu'elle était rachitique et remplie d'obstructions. elle avait douze ans comme je l'ai dit; mais elle n'en paraissait pas plus de huit.

obs. Le second est d'une fille de quinze à seize ans grande et d'un assez beau physique. elle demeurait depuis quelques mois dans l'hôtel-dieu comme domestique. Cette fille fut couchée pour cause de maladie. Le médecin à sa visite lui ayant touché le ventre, le trouva volumineux et très dur vers la région de la matrice: il crut même reconnaître à travers la peau et les muscles du bas ventre, la présence d'un enfant. il mit sur son cahier qu'elle serait visitée par le chirurgien. Je touchai le ventre de cette fille et la tumeur qu'elle y portait: elle était située entre l'ombilic et les pubis inclinant sur le côté droit, allongée et à peu près de la grosseur d'un enfant de sept à sept mois et demi maigre et dont la tête aurait été en bas, et le dos couché au dessus du pubis droit et se prolongeant jusque vers l'ombilic: on distinguait sans peine une espèce de colonne vertébrale dont on pouvait aisément compter les apophyses épineuses: enfin on reconnaissait en quelque sorte les côtes d'un enfant. je fis toutes les questions nécessaires pour avoir son avis. Car le préjugé était contre elle: mais elle persista à dire qu'elle ne savait point mise dans le cas; et elle me répéta plusieurs fois ce serait donc un miracle. elle se soumit à la visite. je la touchai et je reconnus que la matrice était dans son état naturel de virginité. Cette fille qui était très grande et fort menue avait eu ses règles une fois ou deux sept à huit mois auparavant et depuis elle n'avait rien vu. elle fut traitée pour des obstructions par les bains, les apéritifs, les fondants et les purgatifs qui firent disparaître la prétendue grossesse.

Sur le cordon ou le bras qui se présente avec la tête.
L'enfant renfermé dans la Matrice au tems de l'accouchement présente
différentes situations qui toutes se reconnaissent au toucher pendant le travail.
L'orifice utérin étant suffisamment ouvert pour permettre aux doigts de
s'enlouter les parties de l'enfant les plus voisines, soit que les membranes soient
ouvertes, soit qu'elles ne le soient pas. Dans le dernier cas on peut reconnaître
à travers d'elles, et lorsque la matrice n'est pas en contraction, un pied, une
main, la tête ou le cordon umbilical. Dans le premier, c'est à dire lorsque
le bain s'est éloué, indépendamment de toutes les parties que je viens de
nommer, on s'en connaît distinctement et avec sûreté toutes les autres. Si donc
un enfant présente la tête, on dit ordinairement que la situation est
naturelle. Il faut supposer ici que c'est le sommet qui se présente. Car
toute autre partie de la tête peut faire maître des allumens par la difficulté
qu'elle éprouve à franchir le détroit des os du Bassin. Si cette difficulté
a quelquefois lieu dans la situation même la plus naturelle; c'est que
la tête de l'enfant est trop grosse, ou que le Bassin est trop étroit. On
peut mettre au nombre des situations naturelles celles où l'enfant présente les pieds,
les genoux ou le fœtus; puisque l'on voit beaucoup de femmes accoucher ainsi
seules. Toutes les autres situations sont regardées contre Nature. Ce sont toutes
ces différentes situations qui tendent souvent les accouchemens si difficiles et si
pénibles pour les mères et pour les accoucheurs: on les appelle laborieux. Mon
dessein n'est pas de parler d'aucune de ces situations en particulier, ni
de détailler les faits qui y ont rapport; je me bornerai seulement à celles
où l'enfant présente la tête avec le bras seul, et la tête avec le cordon seul.
Je rapporterai les cas où l'on peut repousser avec avantage le bras ou le
cordon: je passerai ensuite à ceux où il serait dangereux de fuir cette
méthode et je prouverai la nécessité de recourir à l'accouchement forcé.
M^r Maudslau tom. 2^e de son ouvrage prouve avec évidence dans les
observations 15. 125. 390. et 609, les avantages qu'il a retirés d'avoir
repoussé le bras qui se présentait avec la tête; il a également réussi en
repoussant le cordon et le tenant assujéti obs. 250 et 260. M^r de la Motte
pag. 470 obs. 31 critique M^r Maudslau sur sa méthode de repousser le
bras ou le cordon de l'enfant qui se présente avec la tête: il en démontre
l'inutilité, et conseille de faire l'accouchement forcé. M^r Desvignes obs. 38
est de l'avis de M^r Maudslau de repousser le cordon. Son commentateur
après avoir démontré la nécessité de repousser le cordon s'en va à
M^r Maudslau pour la manière de le repousser, et de le tenir assujéti: il
conseille ensuite comme Dionis liv. 3 chap. 23 qu'il cite de faire l'accou-
chement forcé. M^r Puzos pag. 174 dit de faire d'abord tout ce que l'on
peut pour faire repasser le cordon derrière la tête et pour l'assujéti;
mais continue-t-il, souvent on ne peut en venir à bout, malgré des efforts
involontaires que fait continuellement la mère pour se délivrer. M^r Levret
conseille de faire l'accouchement forcé si le cordon se présente: le même
auteur a mis en usage les forceps courbes pour accélérer la sortie d'une
tête engagée dans le détroit du Bassin avec le bras dont la main dépassait
la vulve. On pourrait croire d'après toutes les citations que je viens de
faire que je préfère la méthode de repousser le bras ou le cordon toutes les
fois que l'un ou l'autre se présente avec la tête, et que je l'adopte ^{ent.} entre autres.
Je puis assurer du contraire: l'exercice journalier des accouchemens m'ayant

convenir de son insuffisance dans l'un des cas: la variété des faits doit avoir lieu
suivant la variété des circonstances qui se présentent pendant le travail de l'accouchement.
si, par exemple, après un long travail de la part de la matrice, son orifice ne se dilate que
très lentement, mais cependant suffisamment pour laisser passer la main de l'accoucheur,
une main seule, ou le cordon seul se présente avec la tête, et soit telonnu à travers les
membranes ou après qu'elles se sont rompues, ou qu'on ait été obligé de les rompre; si
d'ailleurs la femme est épuisée, si elle éprouve des faiblesses, si la matrice a de la
disposition à tomber dans l'atome, si une hémorragie utérine se déclare, si les
convulsions paraissent; toutes les circonstances n'ont pas besoin d'être réunies; chacune
d'elles exige de la part de l'accoucheur une prompte exécution, et l'obligeant sans délai
de dilater l'orifice utérin, s'il ne l'est pas suffisamment, de rompre les membranes
si elles ne le sont pas et de terminer l'accouchement par les pieds: si par des circons-
tances plus favorables le travail est prompt, si l'orifice utérin se dilate en peu de
temps, et si après avoir rompu les membranes, une main seule ou le cordon seul se
présente avec la tête, si les douleurs sont fortes et expulsives, si elles se suivent de près et
que la tête de l'enfant ait de la tendance à s'engager, les forces de la malade n'étant
point épuisées, et auluns des allidons dont j'ai parlé plus haut ne se déclarant point,
ne peut-on pas en pareil cas, si c'est la main qui se présente seule, la repousser au dessus
de la faillie du sacrum si sa disposition la conduit aisément vers cet endroit et s'y tenir
jusqu'à ce que la tête ait pris la place, ce qui arrive assez promptement lors que le travail est
tel que je viens de l'annoncer: alors l'accouchement se fait naturellement, et on évitera
par là les allidons qui accompagnent quelquefois un accouchement forcé. par la même
raison si le cordon se présente seul avec la tête et que toutes choses égales d'ailleurs les
apparences annoncent un accouchement prochain; ne peut-on pas dans le cas saisir le
cordon avec les doigts, entrer la main dans la matrice et l'assujettir au premier membre
de l'enfant qu'elle rencontre par une ou plusieurs circonvolutions ayant égard à la
longueur du cordon. on ne manquera pas de dire que si c'est un pied que la main rencontre
le premier, il faut terminer l'accouchement: je répondrai qu'il se rencontre quelquefois
des obstacles qui tendent l'accouchement forcé si long et si pénible que la vie de l'enfant
peut être en danger, et qu'il la perd même quelquefois. je n'engage personne à suivre
la méthode que j'établis. si je propose ici un moyen qui m'a réussi vingt fois sans
le moindre inconvénient, ce n'est point dans la vue de le faire valoir; mais bien
dans l'intention de le soumettre au jugement de l'académie. cette compagnie s'acquitte
à qui rien ne peut échapper; l'avertissant néanmoins que je proscrie de ma méthode
celle de moricau et autres qui veulent qu'on place le cordon derrière la tête, cette
méthode ne le mettant point entièrement à l'abri de toutes compressions. je rapporterai
donc plusieurs faits sur la sécurité du cordon repoussé et je commentai par ceux où
l'enfant présente le bras avec la tête. en 1773 j'ai repoussé trois fois avec avantage
le bras qui accompagnait la tête de chaque enfant sans qu'aucun d'eux ait paru en
avoir souffert. le travail était tel que je l'ai annoncé plus haut et les trois
accouchemens ont été terminés promptement et heureusement par les seules forces de
la nature. en 1779 même j'eussite sur deux femmes dont les enfants présentaient
la main avec la tête. en 1781 une sage femme me fit appeler pour terminer
un accouchement dont l'enfant présentait le bras et la main dépassait la vulve.
ayant touché cette la femme je trouvai la tête déjà fort avancée dans le petit
basin: les douleurs fortes et expulsives se suivaient de près. j'assurai la sage femme
que la malade accoucherait ainsi, et qu'en cas que la tête éprouvât quelque retard
au passage, je me servirais d'un moyen pour accélérer sa sortie. l'accouchement
se termina en moins de trois quarts d'heure. l'enfant avait un peu souffert
par la compression que son bras avait éprouvée. en 1784 je fus pareillement
appelé par une sage femme pour secourir une femme en travail dont l'enfant
présentait le bras. ~~je trouvai~~ je trouvai effectivement le bras forti

jusque près l'épaule grise et tumefiée: je jugeai de là que la sage femme avait été dessus. elle en convint en me disant qu'elle l'avait pris pour la jambe. ayant touché cette femme dont les contractions de la matrice étaient très fortes et étaient secondées avec un courage étonnant; je fus surpris de trouver la tête en partu engagée, et de manière à pouvoir être saisie avec le forceps. je l'envoyai chercher: mais pendant le temps qu'on mit pour aller et revenir, cette femme mit tellement à profit les fortes douleurs qu'elle avait, qu'elle accoucha avant le retour de la personne qui était allée la chercher. l'enfant n'était pas encore mort et fut rappelé à la vie. il portait une tumeur sur le pariétal gauche qui annonçait que la tête s'était présentée obliquement: la qui avait favorisé la sortie du bras. il a été très long temps sans faire faire aucun mouvement à son bras. le docteur fait ne peut faire voir en nature d'accouchemens. La manoeuvre de la sage femme étant contre tout préjugé: et si l'enfant a pu sortir malgré cette position défavorable pour l'accouchement naturel, c'est que cette femme était grande et bien proportionnée dans toutes ses dimensions; par conséquent elle avait un bassin très spacieux: car l'enfant était du volume des gros enfants.

il n'est point inutile ni dangereux comme on le dit de repousser le cordon. Mais moi je dis qu'il est avantageux de le repousser et de le maintenir en situation.

obs. Jure par la méthode que j'ai proposée. en 1772 je fus appelé pour accoucher la femme d'un marinier de la paroisse de St donatien d'Orléans qui était dans le travail depuis quelques heures. lorsque je la touchai, je trouvais le travail de la matrice déjà fort avancé; de manière qu'à travers des membranes je sentis distinctement la tête de l'enfant; mais aussi vers la fin d'une douleur je reconnus la présence du cordon ce qui m'obligea à rompre les membranes, l'orifice utérin étant suffisamment ouvert pour y passer la main; alors je touchai le cordon à nu: la tête me parut assez bien placée. cette femme qui avait déjà eu plusieurs enfants, faisait valoir toutes ses douleurs; aussi je ne balançai point à m'emparer du cordon avec les doigts et je glissai ma main le long de la tête et j'entrai assez difficilement dans la matrice où je sentant une main de l'enfant dont le coude formait un angle qui se trouvait inférieurement à cette main. j'y conduisis le cordon et je le fis descendre jusqu'au pli de l'avant bras en manière d'anse, le cordon me paraissant court: alors je détachai ma main. à chaque douleur qui suivit cette opération et même dans l'intervalle de quelques unes, je cherchai à reconnaître si le cordon ne se passait pas; mes recherches furent inutiles: il ne se passait point. les contractions de la matrice qui étaient fortes et bien secondées par les efforts que faisait cette femme pour se délivrer, déterminèrent bientôt la tête à s'engager et l'accouchement fut très prompt. cette même année j'ai répété trois fois cette opération en arrêtant le cordon au pli du bras de trois enfants avec une ~~manoeuvre~~ ^{manoeuvre} tout du cordon qui me parut long. j'eus le même avantage. les accouchemens furent assez prompts et heureux.

obs. 1775 je fus appelé par une sage femme pour faire un accouchement dont le cordon sortait le premier. cette sage femme m'annonça que la tête de l'enfant était prête à s'engager, et qu'elle avait toujours retenu le cordon dans le passage afin qu'il ne fut point saisi par le froid. le cordon sortait de plus d'une demie aune et les pulsations des artères n'étaient point affaiblies. la longueur du cordon ne me déterminait point à faire l'accouchement forcé. la tête qui était sur le détroit du grand bassin, sans être aucunement engagée, se formait exactement excepté du côté par où le cordon s'était échappé. les contractions de la matrice étaient fortes

et expulsives et semblaient favoriser mon opération. je pris donc le parti de
refouler sur cette tête et de la porter un peu du côté opposé à celui par où on je
voulais entrer: alors je me saisis du cordon et j'entrai dans la matrice
où ayant trouvé une main à laquelle je ne crus pas devoir assujettir le cordon
je fus chercher les pieds. j'en rencontrai un et je l'y fixai par trois tours: -
je retirai ensuite doucement ma main abandonnant l'allouchement à la
nature qui en fit tous les frais: il fut un peu long; mais heureux et l'enfant
ne souffrit aucunement de mon opération. il serait inutile de rapporter
tous les autres faits de cette nature dont j'ai fixé le nombre plus haut;
je disai seulement qu'ils ont eus la même réussite par ce qu'ils ont tous
été accompagnés des circonstances les plus favorables telles que je les ai
détaillées et que sur vingt allouchemens terminés naturellement par cette
méthode, il y en a eu quinze à seize où le cordon a été assujetti au
bras.

Enfants nés avec épanchemens d'eau

Dans les grandes cavités



il arrive quelquefois que les enfants contractent dans le sein de leur mère
des épanchemens d'eau dans quelques unes des trois grandes cavités: je dis des
trois grandes cavités parce qu'aucune n'en est exempte. Cette maladie serait
elle particulière à l'enfant, ou dépendrait elle de la disposition naturelle
de la mère. Sans entrer dans le détail de la cause primordiale de cette maladie
je disai seulement que les femmes qui m'ont fourni le sujet des trois observa-
tions que je vas rapporter, éprouverent des bouffissures pendant toutes leurs
grossesses, (la bouffissure des pieds a quelquefois lieu chez celles qui
jouissent de la meilleure constitution) et étaient d'un tempérament
phlegmatique. quoiqu'il en soit toutes les fois qu'un enfant apporte
en naissant une collection d'eau retenue dans l'intérieur du bas ventre,
on dit qu'il a une hydropisie aite: si cet amas d'eau est entre les enveloppes
du cerveau, ou entre les os du crâne elle dure mère, on l'appelle hydrocephale
enfin on est convenu de donner le nom d'empyème lorsqu'il s'est fait un
épanchement dans l'une des cavités de la poitrine ou dans les deux quoique
le mot strictement pris signifie un épanchement de pus: on emploie le
même terme pour désigner l'opération que l'on fait en pareil cas.

Sur la même pag. 610 et suivantes j'apporte quatre observations par les
quelles il fait voir qu'il a terminé quatre allouchemens sans autres secours
que ceux de ses mains dont trois enfants portaient des hydropisies aites et
le quatrième était hydrocephale. Mr Levret pag. 372 suite des allouchemens
laborieux dit qu'il faut ouvrir les os du crâne pour évacuer les eaux qui sont
contenues dessous. je suis parfaitement de cet avis quoique je ne l'aie pas
mis en usage. Comme on va le voir par les observations suivantes qui ont
rapport aux hydropisies du ventre ou de la tête que l'on peut reconnaître avant
que l'enfant soit entièrement forti: car il n'en est pas de même lorsque l'eau est
contenue dans la poitrine; il n'y a pas de signe certain avant l'extraction de
cette partie; car alors de quelque façon que forte l'enfant, l'allouchement est
presque fait.

obs. En 1772 je fus appelé pour accoucher la femme chaton de la paroisse de St Benoit du retour d'Orléans d'une taille moyenne et d'un mauvais tempérament ayant les jambes, les cuisses et les parties génitales considérablement adoucies: le tour de la ceinture l'était également. Le travail de la matrice fut long, les membranes se rompirent et fournirent une grande quantité d'eau: enfin la tête se présenta au détroit du grand bassin et eut beaucoup de peine à le franchir les douleurs étant petites et éloignées: elle sortit à force de travail quoiqu'elle ne fut aucunement enclavée. ayant tiré dessus, je trouvai beaucoup de résistance que je crus dépendre de la mauvaise situation des épaules ce qui fit que je glissai une main le long du cou de l'enfant pour saisir l'épaule et la mettre en bonne situation en cas qu'elle n'y fut pas. je la trouvai assez bien placée, je tirai dessus à la faveur d'un doigt que j'avais passé sous l'aisselle en manœuvre de Crochet et je parvins difficilement à faire avancer vers la vulve. l'enfant me paraissant mort fut néanmoins endossé. alors j'eus la facilité de me servir de mes deux mains pour faire sortir les épaules; mais ce ne fut pas sans peine: je travaillai ensuite à l'extraction du corps qui m'offrit une difficulté insurmontable. Ne sachant à quoi attribuer cette grande difficulté, je crus d'abord que cette femme à qui j'avais eue un ventre très grand, pouvait être grosse de deux enfants et que la position du fœtus pouvait être la cause de ce retard. j'essayai plusieurs fois d'entrer la main dans la matrice, mais ce fut en vain: Enfin après un long et pénible travail je fis sortir cet enfant hydropique dont le ventre contenait environ cinq pintes d'une eau blanchâtre et d'une mauvaise odeur. la femme fut tirée d'affaire.

obs. En 1776 madame Durand devint grosse à la suite d'une perte assez considérable ayant encore le visage, les mains et les jambes adoucies; néanmoins elle se porta passablement bien pendant les sept premiers mois de sa grossesse qui se conservant toujours de la bouffissure; lorsqu'un jour, étant sur la promenade, elle reçut un coup de coude sur le ventre qui l'incommoda beaucoup sur le champ; mais la douleur qu'elle avait ressentie par le coup n'ayant été que momentanée, elle se tint tranquille et attribua à son état de grossesse un peu de malaise qu'elle éprouva pendant tout le huitième mois. les mouvements de l'enfant qui n'avaient point été libres pendant tout le temps de sa grossesse devinrent pendant le dernier mois de plus en plus obscurs: enfin les douleurs se déclarèrent et le travail entra dans le travail qui ne fut pas long. je touchai un pied à travers les membranes qui s'étaient allongées à l'entrée du vagin ce qui m'obligea à les rompre pour les miner l'accouchement. je le faisais ainsi que l'autre qui se trouva peu éloigné, je les fis sortir aussi bien que les cuisses jus qu'au dessus du bassin de l'enfant, alors je fus arrêtée. je posai la main entre le falxum et le ventre de l'enfant pour reconnaître la cause qui en retardait la sortie; mais les côtes se fermaient si exactement le détroit de toutes parts que je ne trouvais pas le moindre petit vuide: je pris donc le parti de tirer fortement sur les cuisses et à force de travail je fis sortir l'enfant qui n'était pas mort. la poitrine était au moins un tiers plus large qu'elle ne l'est ordinairement il velut douze heures. j'annonçai au père qu'il ne pouvait pas vivre long temps, et qu'il serait intéressant de le soustraire: il me le promit. je trouvais à peu près trois chopines d'une eau tirant sur le jaune; mais sans odeur. il y en avait environ une pinte dans la cavité droite de la poitrine, le reste était dans la cavité gauche. la mère fut établie en assez peu de temps. cette hydropisie de poitrine est la seule que j'aie rencontrée.

obs. En 1786 la sage femme de la salle des femmes en Couches de l'hôtel-dieu de cette ville me fit appeler pour un accouchement de force. elle avait déjà fait quelques tentatives à l'aide d'un étudiant en chirurgie de cette maison qui fut arrêté par ~~deux~~ ^{deux} pieds de l'enfant qui faisait arc contre les pubis. je le degageai et ayant joint la tête offrit une telle résistance que je crus ne pouvoir en venir à bout étant obligé de ménager le cou de l'enfant qui était mort. la mâchoire fut la quelle je tirais d'une main tandis que l'autre affermissait le cou et le derrière de la tête, résista heureusement; et après un travail de plus d'une heure, étant aidé par cet élève qui tenait sur le corps, je parvins à faire sortir cette tête monstrueuse par la quantité d'eau qu'elle tenfermait. plusieurs chirurgiens qui eurent occasion de la voir, furent étonnés de sa grosseur énorme. je me disposais à en prendre toutes les dimensions lorsque je fus appelé dans une autre salle pour visiter un malade. à mon retour j'appris qu'un de ces messieurs l'avait emportée.

Sur un spina bifida



Le spina bifida est sans contredit l'un des vices de conformation le plus funeste pour les enfants qui en sont atteints puisque la perte de leur vie est inévitable. Dans quelque endroit que ce soit de la colonne épinière où le défaut de conformation ait pris naissance, il s'annonçait ordinairement par une tumeur plus ou moins considérable en raison de l'étendue plus ou moins grande de l'endroit du canal vicié. et l'on s'annonçait aisément au touchet la fluctuation de l'humour contenue. il n'y a point de moyens curatifs à opposer à cette maladie. si l'on ouvre la tumeur, on altère la source de la moelle épinière; si l'on cherche à la fixer par la compression, la tumeur se fait jour d'elle-même: ainsi de quelque côté que l'on tourne, les enfants seront toujours les malheureuses victimes de leur conformation vicieuse. on lit dans le traité des accouchemens de M. Levret pag. 246 section 3 tout ce que l'on peut dire sur le vice de première conformation; mais l'auteur ne parle que de l'espèce de spina bifida avec tumeur: il ne dit rien du spina bifida ouvert avant la naissance. L'exemple que je vais donner est de cette nature: il y a même lieu de croire qu'il s'est ouvert très long tems avant que l'enfant fut né et même enlore que l'ouverture de la peau et l'éclatement des muscles font eux mêmes un vice de la première conformation ainsi qu'il sera aisé de s'en convaincre par l'exposé que j'en fais.

obs. au mois de novembre 1780 je fus appelé pour accoucher la femme dauphinaise de son troisième enfant dont elle accoucha promptement et heureusement. l'enfant qu'elle mit au monde était un garçon du volume des gros enfants; il était en outre très gros et annonçait qu'il n'avait point souffert dans le sein de sa mère par le bon point qu'il avait. je le donnai à la garde qui ne s'aperçut qu'après que je fus sorti que cet enfant portait au dos une ouverture. on me fit s'avertir pour l'examiner et on m'assura qu'elle avait beaucoup d'appart avec les parties génitales d'une fille. j'examinai cette ouverture ^{dont le centre} ~~qui~~ était située sur la première vertèbre lombaire; elle était de la longueur de quatre bons travers de doigts: sa disposition perpendiculaire était telle que la peau nullement altérée dans aucuns points de toute l'étendue de son ouverture, mince et de couleur absolument naturelle, formait deux commissures supérieurement et inférieurement qui offraient par gradation un intervalle au centre d'environ un pouce et représentaient assez bien deux lèvres applaties que l'on pouvait soulever plus ou moins au centre et vers les commissures. Les deux muscles grands dorsaux ~~qui~~ ^{qui} ~~étaient~~ ^{qui} avaient conservés leur beau rouge vivant étaient moins écartés que la peau et unis de même supérieurement et inférieurement; ils imitaient assez deux petites lèvres: on pouvait également les soulever un peu vers le centre de leur écartement. Les deux intervalles que laissaient la peau et les

muscles ou peuvent mieux être figurés que par une ellipse dont les extrémités allongées formeraient deux angles très aigus. on appellerait dessous des petits prolongemens charnus qu'on aurait pu appeler caroncules myxiformes : enfin on voyait une ouverture de figure ovale qui conduisait au canal vertébral, et par où s'échappa ensuite la moelle en fonte : quelquefois il en sortait du sang très vermeil. tel était le *Syrina bifida*. l'enfant qui le portait a vécu cinq mois. il était en nourrice en campagne où il est mort à mon infu, le qui m'a empêché de prendre cette pièce comme je l'avais projeté. on voit par tout ce que je viens de dire que la peau n'a souffert aucune dilatation sensible, que les muscles n'étaient aucunement altérés et que l'enfant a pris de l'embonpoint pendant les neuf mois qu'il a été renfermé dans le sein de sa mère ; d'où je conclus qu'on ne peut seiquer en doute que l'ouverture de la peau et l'écartement des muscles ne soient aussi anciens que le défaut de conformation du canal vertébral, qu'ils sont eux-mêmes un vice dès la première conformation ; que si l'enfant a pris de l'embonpoint dans le sein de sa mère ; si les eaux ne mont rien offert de particulier ; c'est sans doute que la moelle épinière n'a pas été en fonte pendant tout le séjour de l'enfant dans la Matrice au milieu des eaux : et que si la fonte s'en est faite promptement après la naissance, ce n'est que parce qu'elle a été frappée par l'air atmosphérique.

Sur une tête restée seule dans la matrice

ont de la motte pag. 10 et 11. de sa préface fait voir que de tous les accouchemens qu'il a terminés par force, aucun ne lui a résisté, et qu'il a vaincu avec avantage tous les obstacles qu'il a rencontrés. ne pourrait on pas répéter ici, sans faire tort au mérite distingué de cet habile accoucheur, ce qu'il dit en parlant de *mr* Moreau et peu, qu'il s'est trouvé dans un tems assez heureux, ou qu'il a exagéré les difficultés qui se sont présentées dans la manœuvre des accouchemens forcés et portés trop loin. les accidens qu'il a rencontrés et combattu avec tout l'avantage qu'il désirait. la chirurgie des accouchemens a fait depuis lui des progrès frappans ; et malgré cela tous les grands maîtres conviennent qu'il se présente journellement des difficultés que les plus célèbres accoucheurs ne peuvent quelquefois vaincre. il y a tout lieu de croire qu'elles étaient rares dans les endroits où *mr* de la motte exerçait. cet habile accoucheur avait tous les instrumens dont ses prédécesseurs se servaient dans l'exercice des accouchemens tels que les tire-tête, les crochets, les haes, les couteaux pag. 17 de sa préface ; cependant on voit dans sa 253^{ème} observation qu'il a été obligé de se servir d'un bistouri avec lequel il fit une ouverture à la tête d'un enfant séparé du corps et restée dans la matrice pour en vuider une partie de la cervelle et diminuer par là son volume. il y a donc des circonstances où les mains seules ne sont pas suffisantes, et où l'on est forcé de se servir d'instrumens : quoiqu'on ne puisse pas nier que les mains seules ne puissent quelquefois faire cette opération qui a eu lieu par les seules forces de la Nature tel que l'observe *mr* Levret pag. 4. de la première partie de son traité sur plusieurs accouchemens laborieux et célèbre matière après avoir analysé toutes les méthodes mises en usage.

par tous les savans jusqu'à lui, après avoir passé en revue tous les instrumens dont les auteurs se sont servis pour extraire une tête vertée seule dans la matrice; d'après avoir établi les toutes les causes capables de donner lieu à ce fâcheux accident par rapport à l'enfant et à la mère séparément ou ensemble; j'apprit tous leurs instrumens et en propose de nouveaux dont la perfection réunit tous les avantages: de ce nombre sont son forceps courbe et son tire-tête; mais cet excellent auteur a bien senti que son tire-tête ne pouvait faire passer une tête volumineuse par le détroit d'un bassin mal conformationné; en conséquence il a perfectionné les crochets. Lors donc qu'une tête volumineuse sera vertée seule dans la matrice et que le bassin sera telonnu mal conformationné; je crois qu'il est indispensable, avant d'employer aucune force, d'ouvrir la tête pour en vuider la cervelle: Le fait suivant convaintra de cette nécessité.

Obs. je fus appelé par un chirurgien de cette ville pour l'aider dans un cas de force. La mauvaise situation de l'enfant ayant déterminé à faire l'accouchement forcé, le corps était sorti lorsque j'arrivai: en conséquence j'entrai une main et je portai deux doigts dans la bouche tandis que l'autre était appuyée le long du cou et de la partie postérieure de la tête; alors j'engageai mon confrère à tirer sur le corps. Nous travaillâmes tous les deux à faire sortir ainsi la tête; mais ce fut en vain, le corps se separa par la longueur du travail: la machine en fit autant, et il nous resta pour toute ressource celle de vuider la tête et de la faire sortir à l'aide des crochets: ce que nous ne pûmes obtenir qu'après un long et pénible travail par le peu d'espace qu'il y avait entre la saillie du sacrum et les pubis. Le vice de conformation peut être mis au nombre de ceux de la première classe en ce genre. Cette femme se tira d'affaire; Mais elle redeint grosse et changea de chirurgien. Celui-ci ayant été appelé dans le nouveau travail telonnu que l'enfant présentait la tête la première et engagea cette femme à mettre à profit les douleurs qu'elle éprouvait. il se passa quatre jours sans que la tête parut vouloir s'engager malgré toutes les préparations convenables, l'orifice utérin étant effacé et les membranes ouvertes. à l'absence de ce chirurgien qui était sorti pour quelques affaires; on me fit prié de s'en passer: j'y fus sur le champ. je trouvais cette femme assise près le feu qui me dit que rien n'avancait depuis quatre jours qu'elle souffrait: au même instant elle demanda qu'on la remit au lit parce qu'elle se trouvait faible: deux femmes l'aidèrent et dans le trajet du feu à son lit, elle mourut. je levais, l'enfant était mort. j'examinai le bassin qui se trouva tel que je l'ai dit. son premier chirurgien connaissant le vice de conformation n'aurait pas laissé passer cette femme souffrir pendant quatre jours, il aurait tenté l'opération césarienne et peut être l'aurait-il encore sauvée, et son enfant.

Sur une Entéro-vaginale

il est aujourd'hui généralement telonnu que non seulement les intestins et l'épiploon séparément ou ensemble peuvent sortir de la capacité du ventre par tous les endroits qui ne sont point défendus par les parties charnues capables de s'opposer à leur passage; mais encore que l'orthome et la vessie peuvent former des hernies ainsi que nous l'apprenons de la preuve dans son savant mémoire inséré parmi ceux du premier vol. des mem. de l'Acad. de chirurgie. Cet habile chirurgien est le premier qui ait fait la description des entéro-vaginales et des hernies par le trou ovalaire. Mr. Boim rapporte qu'une demoiselle eut une entéro-vaginale déterminée par des efforts pendant une constipation.



Mr de ~~gar~~mann dit qu'un chirurgien ouvrit inconsiderement le sac d'une entérocele
vaginale et que le caecum et une grande partie du colon sortirent par cette
ouverture. Mr Levret et Boim font mention dans leurs ouvrages d'une entérocele
vaginale formée par le S. du colon que Mr Boim a reconnue sur le cadavre
d'une fille. Le même Mr Boim cite plusieurs autres observations sur des entéro-vagin^{ales}
entre autres celle située derrière les pubis et reconnue pendant le travail de
l'accouchement et qui ne put être réduite qu'après: il dit aussi que le Docteur Smellie a
reconnu ces sortes de hernies. on y voit que le Docteur parle d'une entérocele vaginale
assez considérable pendant le travail qu'il a réduite et que la tête de l'enfant a
pris la place. Mr Levret a rencontré des entéro-epiplo-vaginales; il donne les
signes qui les caractérisent et qui les font différer de l'entéro-vaginale: enfin
on lit dans l'ouvrage de Mr Boim que Mr Stubbs fait mention d'une entérocele
vaginale si grosse qu'il la prit d'abord pour la tête ou pour les fesses de l'enfant:
il la réduisit et alla à la sortie de l'enfant avec le forceps. Mr Gunz prétend
que Mr Lemaire est le premier qui ait fait usage de l'éponge préparée pour les
espèces d'hernies. Mr Haemel s'en est servi avec succès en pessaire pour une
entérocele vaginale. Mr Garangeot et tous les chirurgiens après lui pratiquent
le pessaire en forme de bondon creux. on voit que de toutes les entéroceles
vaginales dont j'ai parlé, il n'y a que deux filles qui en aient été atteintes.
cette maladie est plus commune chez les femmes qui ont eues des enfants parce que
le vagin ayant souffert une grande distension, son tissu est plus lâche et
par conséquent plus facile à pénétrer. L'observation que je vas rapporter est
pareille à celle de Mr Stubbs; mais la malade n'étant point affaiblie, je
n'ai pas cru devoir me servir du forceps pour aller à la sortie de l'enfant.

obs. En 1778 madame gangnau grosse de son second enfant et en travail pour accou-
cher me fit prier de vouloir bien lui donner mes soins dans cette occasion. arrivée
chez elle, elle m'assura que le travail ne faisait pas long puis qu'elle sentait déjà
l'enfant au passage. je la touchai aussitôt et je trouvai le vagin absolument
rempli par une tumeur très dure et si grosse qu'il me fut impossible de la
reconnaître ne pouvant glisser aucun doigt entre elle et le vagin pendant
la contraction de la matrice. la douleur étant finie, je portai deux doigts dans
le vagin; la tumeur était plus molle, je m'appuyai même qu'elle obéissait à mes
doigts, et qu'elle suivait leur compression: ce qui me facilita de reconnaître
l'orifice de la matrice qui était presque effacé. Les membranes n'étant point
ouvertes et je pus toucher au travers d'elles la tête de l'enfant. pendant cette
recherche la matrice se contracta de nouveau et mes doigts furent fortement
comprimés par la tumeur; elle était tendue et n'offrait aucune inégalité. je
reconnus alors l'entéro-vaginale: elle prenait naissance de la partie latérale droite
du vagin un peu portée en haut. j'en fis la réduction et la face herniaire me
parut absolument vide. sans perdre de temps j'ouvris les membranes et je pris
le parti de placer tous mes doigts sur l'endroit par où je l'avais fait entrer, et
de serrer ainsi la main pour la contenir réduite jusqu'à ce que la tête eut pris la
place: ce qui ne tarda pas, ayant la précaution de me tenir ma main que peu
à peu à mesure que la tête avançait dans le vagin et la chassait pour ainsi
dire. je parvins à terminer ainsi cet accouchement sans que cette dame fut assujettie
à l'usage du pessaire en bondon creux dont elle fut bien trouva. elle n'a
point eu d'enfants depuis. la facilité avec laquelle je fis disparaître deux
fois cette hernie avant l'accouchement, la même facilité qu'elle eut par la suite
à se retirer et d'en faire de nouveau me firent juger qu'elle était habituelle et que cette
dame la portait depuis longtemps: effectivement elle m'en convint et m'avoua
qu'elle portait cette incommodité depuis son premier enfant qui précédait celui-ci de

Dix ans : elle Majouta qu'on lui avait conseillé différents moyens qui n'étaient point celui dont je lui fis faire usage.

Sur une Superfetation



celle des trompes de fallope suivit de près et fut favorable aux œufs :

La superfetation n'est autre chose qu'une nouvelle Conception chez la femme déjà enlainte. Le tems seroit-il de tems même pour cette nouvelle génération. morileau ne s'est point déridé ni pour ni contre la superfetation; neam^{ins} mo il rapporte qu'il alloucha une femme à terme d'une forte fille vivante et qu'ayant voulu la délivrer, il amena avec la délivre un autre enfant mort très petit et qui ne lui parut avoir par sa grosseur et grandeur que quatre à cinq mois; mais il conclut qu'il avoit été formé du même Coit que l'autre puis que les deux placentas étoient adhérens l'un à l'autre. Le même auteur admettant le mélange des liqueurs, dit que la superfetation ne peut avoir lieu les six premiers jours de la Conception, mais bien, si elle est possible depuis ce tems jusqu'au trentième jour. aphorismes 101 et 102. m^r Levret dans sa réponse au premier de ces deux aphorismes dit que cette hypothèse a quelque sorte de probabilité si on adopte le sentiment opposé à celui des ovaristes; mais que si on est de la dernière, c'est tout le contraire; car ceux-ci prétendent que si la superfetation peut avoir lieu, c'est plutôt dans les premiers jours de la Conception que plus tard. Les physiiciens ne doutent plus aujourd'hui qu'il ne puisse arriver des superfetations et le fait selon eux est constaté par un grand nombre d'observations; mais comment expliquer cette seconde Conception si l'ovifère utérin est aussi exactement fermé après la première qu'on le prétend. Ce seroit bien ici le cas de rapporter tous les systèmes ingénieux de ceux qui ont écrit sur la génération des animaux, on y trouveroit peut-être quelque chose de favorable à la superfetation. Le premier de tous ces systèmes est la rencontre des deux semences et de leur mélange dans la matrice; il en résulte un être animé aristote alloit à la liqueur du mâle le principe de la génération, celle de la femme ne servoit qu'à la nourriture et à l'allaitement du fœtus; vint ensuite la découverte des ovaires, et leurs vésicules furent prises pour des œufs; on crut alors que toute la fécondité dépendoit de la femelle, le fœtus étant contenu et déjà tout formé dans chacun des œufs mâles et femelles à l'infini. quel changement vas se faire dans la génération! harzoi^{er} et a trouvé une multitude innombrable d'animaux vivans dans la liqueur spermatique du mâle et rien de semblable dans toutes les autres liqueurs y compris celle que la femme répand. toute la fécondité fut alors rendue au mâle et le petit ver mâle ou femelle contient toutes les générations de père en fils. le système donna naissance à un autre qui partit de des deux précédens: dans celui-ci tout le principe de vie se fixe dans le petit animal et l'œuf est une masse de matière propre à sa nourriture et à son allaitement. ces petits animaux s'entrent dans la matrice; si l'un d'eux s'entrent l'embouchure de la trompe, il se parcourent, entre dans l'ovaire, perce l'œuf, s'y loge et y reçoit les premiers degrés de son allaitement. Litter, graaf et van huyen ont vu des entrées aux ovaires. Litter a trouvé un petit fœtus dans un œuf enlora attaché à l'ovaire; le même a trouvé un œuf dans la trompe. harwei dans toutes ses expériences n'appercut rien de ce que graaf avoit observé; et de ce qu'il n'a jamais trouvé de semences

dans la matrice; le mélange des liqueurs paraît se détruire. Les physiiciens
 modernes comparant les animaux aux plantes, veulent réduire toutes les
 générations à de simples développemens: selon eux point de nouvelles produc-
 tions. toutes les générations à l'infini étoient contenues déjà formées dans le
 premier homme et la première femme. Des cartes fait revivre le système des
 anciens; il croit que l'homme est formé du mélange des liqueurs de l'un et
 l'autre sexe et il explique par les loix du mouvement et de la fermentation
 comment se forment les différens organes. Mr de Maupertuis ayant regardé
 à la ressemblance des enfans à leurs pères et mères, conclut en faveur du
 mélange des deux semences; et il pense que les animaux spermatisques peuvent
 être de quel qu'usage pour la production de l'animal. admettra-t-on le
 système de l'absorption de la liqueur féminale par les pores de la matrice, qui
 après avoir parcouru toutes les voies lactées, se dépose dans l'ovaire pour
 détacher une vésicule et l'obliger à descendre par la trompe dans la matrice:
 c'est ici que le spectacle est merveilleux: tous les petits vers dégages de la matrice
 et errans dans la matrice, environnent de toutes parts la petite vésicule; —
 chacun veut s'y introduire: mais un seul sera victorieux, il entrera par la
 petite soupape qui se fermera aussi tôt et la fécondation sera achevée. —
 enfin Mr de Buffon détache des molécules organiques des différens parties
 du corps de l'un et de l'autre sexe qui vont se rendre aux testicules de l'homme
 et de la femme pour y développer la qualité prolifique; et de leur mélange dans
 la matrice naît le petit embryon par les loix de l'attraction ou d'affinité.

+ puisque chacun voit les choses à sa manière; si j'étais obligé de dire mon
 sentiment sur la génération: j'admettrais dans la semence de l'homme
 une sorte d'esprits Capables de vivifier et de modeler le petit embryon
 contenu en abrégé dans l'œuf; et je ferois mettre l'accroissement du fœtus dans
 la matrice aux loix du développement: mais tout n'est que conjecture et
 il faut convenir que le mécanisme de la génération sera toujours pour nous un
 mystère enveloppé de ténèbres impenetrables. je reviens donc à la superfœta-
 tion. Mr de Buffon considérant la matrice comme très spongieuse et très
 utérin qui se trouve fermée, pourra cependant s'ouvrir à travers ses pores
 et parvenir à son intérieur; qu'alors y trouvant la semence de la femelle
 tombée des ovaires par les trompes de Fallope, le mélange se fera et
 aura lieu de cette manière: je crois au contraire que cette féconde concep-
 tion se fait dans le même ordre que la première. l'ovifère utérin s'ouvrant
 s'ouvre ^à toujours à l'esprit féminin une issue plus
 libre que les pores de la matrice; il suivra la route que la nature lui a destinée et
 la superfœtation aura lieu. je ne pense pas non plus qu'il y ait de tems
 déterminé pour la superfœtation. la femme qui me fournit le sujet de
 celle que je vas rapporter étoit grosse de huit mois et la superfœtation ne paroissoit
 pas avoir plus de quatre mois.

obs. La femme perçue de la paroisse de St priene le puellier d'aleans grosse
 de huit mois et qui avoit déjà eu plusieurs enfans, me fit appeler le 20.
 mai 1772 étant en travail pour accoucher et perdant du sang. huit jours
 avant celui où je fus appelé, elle fit une chute sur le ventre et depuis ce
 moment elle avoit souffert qu'elle sentit bien son enfant remuer. elle
 me dit que le sang avoit commencé à couler dans la nuit et que les douleurs
 s'étoient déclarées au même instant: qu'enfin il étoit sorti de l'eau le matin.
 L'ayant touchée, je trouvai un pied très petit engagé et pendant dans le vagin;

L'autre pied était enroulé dans la matrice et le corps de l'enfant couché sur l'osifile qui était assez dilaté pour y passer la main. je fis sortir sur le champ le petit fœtus mort qui me parut au plus avoir quatre mois. son cordon très grêle ne m'offrant point assez de force pour l'extraire dessus, je profitai de la dilatation de la matrice pour aller chercher le placenta que je trouvais à l'entrée et entièrement détaché: il était également petit & de nouvelles contractions de la matrice, le ventre de cette femme étant à peu près aussi gros qu'auparavant, en un mot un enfant aussi petit pour une grossesse que l'on m'assurait être de huit mois: toutes ces circonstances me déterminèrent à la toucher de nouveau. la matrice loin de s'être serrée, son osifile était plus dilaté. j'entrai dans la matrice et je trouvai les membranes du second enfant qui faisaient corps vers le côté droit. je les ouvris et je fis l'accouchement par les pieds. le second enfant était fort et bien vivant: il me parut au moins que la mère l'avait annoncé. je crois d'après ce que je viens de dire que le premier enfant était véritablement un superfoetus.

De la nécessité des laes - et de la cruauté qu'un chirurgien exerça sur une femme de campagne.



Les laes ne doivent point être entièrement rejetés de l'exercice des accouchemens, il y a des circonstances où ils peuvent être d'un grand secours: quoiqu'il en soit de la molle pag. 461 et suivantes assure leur inutilité et les regarde comme nuisibles. il est bien certain que si l'on s'en servait de la manière que cet auteur annonce, leur emploi ferait préjudiciable à la mère et à l'enfant; mais lorsque dans un cas de force, on est obligé d'aller chercher les pieds d'un enfant, si la main en rencontre un ou les deux, quelle ne puisse les saisir que d'une manière mal assurée, ses efforts devenant inutiles pour une prise plus sûre, l'enfant fuyant pour ainsi dire la main qui veut le saisir sans changer de position; il arrivera donc quelquefois que la résistante sera insurmontable tant par le que la lâche masse des laes dont l'enfant est quelquefois entouré, faita toujours glisser la main de l'accoucheur, que par le que la matrice toujours en action par la présence de la main, - présentera elle-même et la mettra dans l'impossibilité d'agir: alors le chirurgien sera forcé de rester dans l'inaction ou de retirer sa main. un pareil travail continué longtemps et de différentes reprises ne peut qu'être préjudiciable à la mère et à l'enfant. pour obvier à cet inconvénient voici la manière dont je me sers de ~~de laes~~ du laq et les cas où je le mets en usage avec succès lorsque je suis obligé de faire l'accouchement forcé soit que le bras se présente ou telle autre partie de l'enfant. le laq fait avec le fil, le coton ou la soie sera construit de manière que l'une de ses extrémités sera fendue et fermée ensuite sans interruption du fil dont il sera composé afin qu'il ne présente en cet endroit ni nœud ni inégalité: cette fente élèvera l'autre extrémité qui étant éloignée de l'extrémité fendue, y laissera une anse capable de relever le pied de l'enfant sans incommoder le bas des jambes. si donc je suis obligé de faire sortir l'enfant par les pieds; j'entre la main dans la matrice et je vas les chercher: si l'un d'eux se présente à ma main, je cherche l'autre, et si je ne le trouve pas, je tire sur celui-ci afin de faciliter l'autre présente: Mais si j'y rencontre la résistante dont j'ai parlé, quelle me paraît insurmontable et quelle semble m'engager dans un long et pénible

travail qui pouvait être préjudiciable à la mère ou à l'enfant et peut être aux deux; si d'ailleurs les autres circonstances que j'ai détaillées accompagnaient le travail, je retire ma main; je l'arme du laq après lui avoir fait faire hanse qui se trouvera arrêtée à l'extrémité du doigt du milieu, le reste sera tiré dans une gouttière que formera la main en rapprochant le petit doigt du pouce tandis que le doigt indicateur et l'annulaire assujettissent le laq au doigt du milieu. j'entre une seconde fois dans la matrice, je fixe le laq au dessus du pied et sans sortir cette main, je tire avec l'autre sur le laq dans une direction convenable, et par ce moyen j'oblige l'autre pied à se délançonner et à s'approcher de ma main qui l'attend: Lorsque je l'ai saisi, je l'unis au premier et je les fais ainsi sortir à l'aide de ma main qui les tient et du laq sur le quel l'autre main tire; alors mon laq devient inutile et je finis l'allouchement en bien moins de tems que si je me fusse obstiné dans mon premier travail. je pourrais citer beaucoup d'exemples où j'ai réussi par cette méthode soit que je l'aie employé seul, soit qu'elle ait été mise en usage par d'autres chirurgiens sans que les mères ni les enfants aient paru en avoir souffert.

Obs. il n'en est pas de même de celle qu'un chirurgien de campagne mit en usage: elle est inouïe, et elle est absolument meurtrière. Le chirurgien me fit appeler en aoust 1781 pour l'aider dans un cas de force. étant arrivé à St Denis en Val d'Igny de l'Alsace de deux lieues, une personne me conduisit chez la malade que je trouvai mourante, le visage pâle et livide, presque point de pouls et les extrémités froides. ayant touché, je fus arrêté dans le vagin par un morceau de bois qui me piqua le doigt. je demandai au chirurgien ce que cela signifiait; il me dit que cette femme était depuis trois jours dans le travail et que malgré que la matrice fut ouverte et que la tête, selon lui, fut bien placée, néanmoins elle ne s'était aucunement engagée; qu'en conséquence il avait pris le parti d'introduire à différentes fois des osiers qu'il avait fait passer, disait-il, par dessus la tête, et qu'ayant tiré dessus après les avoir assujettis près la vulve en forme de nœuds, ils s'étaient rompus: qu'enfin il avait fait une rotte, c'est son terme, avec trois ou quatre de ces osiers, qu'il avait de même passés sur la tête de l'enfant, et que trois hommes et lui avaient tirés dessus; qu'elle s'était également rompue et que plusieurs morceaux étaient restés dans la matrice. je touchai de nouveau cette moribonde et je sentontrai effectivement plusieurs de ces morceaux d'osiers autour du cou de l'enfant dont la position était telle que la partie latérale droite de la tête était appuyée sur le bord de l'arcade des pubis; et le cou dont les vertèbres étaient luxées et la mâchoire étaient engagées dans le détroit du grand bassin. je dis aux personnes qui étaient présentes que la malade n'avait pas une heure à vivre, et qu'il fallait se presser pour les docteurs de l'église. je me retirai en annonçant au chirurgien qui sortit pour me conduire que le moyen dont il s'était servi, était très inhumain et qu'il avait tué la mère et l'enfant. à peine étais-je entré chez moi, qu'un de mes confrères qui était allé d'un autre côté fonder un de mes malades, arriva: je lui racontai cette histoire tragique et inhumaine. il m'engagea à y retourner pour ouvrir cette femme; j'y consentis quoique nous fussions très avancés dans la nuit. nous

primus à la hâte quelques rafraichissemens et nous partimes. arrivés chez le chirurgien, nous apprîmes de lui quelle était morte très peu de tems après que je l'ai eu quittée. Nous l'engageâmes à s'en venir avec nous: il s'y refusa. Comme il y avait encore une demi-lieue à faire dans la traversée, nous lui demandâmes le chemin: il nous assura que, quand même il nous mèlerait dans le chemin, nous ne manquions point de nous égayer par le nombre d'autres que nous trouverions. il était alors plus d'une heure après minuit. Nous fûmes obligés de s'en venir.

L'académie ne pourrait elle pas solliciter le gouvernement afin que, dans chaque principale ville de province, il fut nommé un chirurgien choisi par elle qui ferait tous les ans ou plus souvent de faire une tournée dans tous les departemens de sa province pour prendre connoissance des accidens qui arrivent journellement dans les campagnes tant dans l'exercice des accouchemens que dans celui des autres opérations chirurgicales dont un grand nombre de personnes utiles sont les victimes. (nous voyons arriver tous les jours dans notre hotel-dieu de ces malheureux à la veille de mourir sans qu'on leur ait porté la moindre secours analogue à leurs maladies.) Le même chirurgien nommé par l'académie ferait également tenu de faire passer à tous les chirurgiens de campagne de son departement tous les trois mois une instruction du manuel de chaque opération en les engageant néanmoins à ne pas faire les grandes opérations sans appeler un chirurgien de grande ville. on conserve était peut être par là une foule de citoyens utiles: en effet combien d'entropies par fractures mal tenues ou par luxations non réduites: combien de morts par hernies avec étranglemens méconnues ou mal traitées: enfin pour s'en venir au sujet que je traite; combien d'enfants mutilés avant d'être nés: tous les jours nouveaux accidens par impréssion. Là c'est un bras coupé pour extraire le corps d'un enfant, une tête vidée par laquelle aura passé du tems au passage. ici c'est un enfant tiré par morceaux du sein de sa mere; celle-ci meurt: quels sont les chirurgiens qu'on choisit dans ces cas graves? quelquefois ceux qui ne s'occupent pas même des accouchemens. L'académie ne pourrait elle pas encore s'occuper à faire changer l'ordre des réceptions pour les chirurgiens de campagne ou des petites villes qui ne consiste qu'en un ou deux examens de quelques heures

Sur un renversement complet de la matrice

parmi les auteurs qui ont écrit sur les renversemens de matrice, on peut citer hypostrate, gallien, guillemeau, morileau et la motte; mais tous ces écrivains n'avaient qu'ébauché cette importante matiere: il était réservé à mr purzer, levet et fabatier de la traiter à fond. il semble que rien n'est échappé à mr fabatier dans son savant memoire sur les deplacemens de la matrice. Consigné parmi ceux de l'académie tom. 3. pag. 361 et suiv. le savant dit à la seconde page de la seconde partie de son memoire: « on ne doit pas toujours attribuer le renversement de la matrice, qui se fait « au tems même de l'accouchement, à l'impression de l'opérateur. cet accident « arrive souvent, quelque précaution qu'on prenne, soit par que les femmes « font des efforts trop violens pour se délivrer, soit par que le placenta est « fort épais et fort lourd, soit enfin par une disposition naturelle, dependante



de la faiblesse de la matrice; disposition qu'on ne peut prévoir, et à l'effet
à la quelle on ne peut s'opposer. Il cite quelques exemples à ce sujet
qui ont beaucoup de ressemblance à celui que je vas t'apporter.

obs. madame Rogier en travail de son second enfant, me fit appeler le 19
gbre 1786. Le travail fut vif et elle allocha assez promptement. Je con-
naissais le mémoire de Mr Leret sur la méthode de délivrer les femmes
après l'allouchement, et j'avais contracté l'habitude de toucher le ventre
des femmes allochées avant de les délivrer. ayant donc donné à la mollesse
du ventre de cette dame que la matrice était dans un entier relâchement, je
ne me hâtai point de la délivrer: j'attendais le moment favorable. Dans cet
intervalle de tems, la garde s'étant aperçue que l'enfant perdait du sang
par la petite portion du cordon sortie à son ventre, m'appela: je fus serrer
le nœud que j'avais fait. pendant le moment la dame Rogier me rappela, en
me disant que tout lui sortait du corps et faisant des efforts violens sans
pouvoir se retenir. je pris aussitôt le cordon d'une main, et l'autre main
avec les doigts de l'autre dans le vagin, je trouvais la masse du placenta
attachée à un corps dur qui remplissait tout le passage. je ne doutai point
que ce ne fut un renversement de matrice. je voulus m'opposer à sa sortie,
mais ce fut en vain: les efforts violens qu'elle faisait, l'emportèrent sur ceux
que je leur opposai. la matrice dépassa la vulve de plus de huit poudes de
long. Cet organe ainsi pendant entre les cuisses formait une tumeur enorme
qui tendait dans son intérieur à droit et à gauche tous les ligamens qui
me paraissent d'un volume assez considérable. je n'avais jamais vu le fond
de matrice siante, et je peux assurer que j'en vis pas celui-ci sans
inquiétude. le placenta qui était attaché au fond de la matrice c'est à dire
à la partie la plus basse de la tumeur un peu du côté droit était très gros
et fortement adhérent dans tous les points de sa face convexe hors que la matrice
est dans sa situation naturelle et devenue convexe en raison de son renversement.
Ayant détaché le plus promptement possible, et ayant aussitôt fait porter
la malade, qui était allochée de bout, sur son lit, je la fis mettre en
situation convenable et je procédai à la réduction de la matrice que j'obtins
sans beaucoup de peine et en assez peu de tems. je tetai la main dans la
matrice en l'agitant avec mes doigts hors l'endroit de son attache avec le
placenta, jusqu'à ce qu'elle se fut contractée sur elle-même, et qu'elle m'eût
annoncé la nécessité de la serrer. il n'y eut de sang perdu que pendant
le décollement de l'arrière-faix; le degorgement des artères utérines devint
sans doute salutaire: car cette opération ne fut suivie d'aucun accident
sinon un peu de fièvre et un peu de sensibilité à la région de la matrice
qui disparurent par le régime diététique, les fomentations, les cataplasmes
émolus et les injections de même nature. la malade se rétablit fort
bien. le 8. gbre 1787 cette même dame en travail de son troisième
enfant, me fit appeler. cette nouvelle fois je la fis mettre au lit où elle
allocha assez promptement. je n'avais point oublié l'accident précédent,
aussi ne crus-je pas devoir attendre, pour la délivrer, le moment indiqué
par la nature. j'entrai donc une main dans la matrice en suivant le
cordon qui me servait de guide et je fus chercher le placenta que je
trouvai au fond de la matrice adhérent de toutes parts. n'ayant rien à
craindre pour le renversement tandis que ma main soutenait le fond
de la matrice, je voulus savoir, si en tirant sur le cordon avec l'autre

main, il pourroit avoir lieu: j'essayai donc, et quoique la tentative fut
legere, je m'apparus que l'arrière-faix, sans se detacher, entraînait avec lui
l'endroit de l'utérus où il était adhérent: je le detachai doucement et je le fis sortir
suivant la methode ordinaire en pareil cas. la matrice se contracta aussitôt
et il n'y eut point de perte. le placenta était aussi gros que le precedent.

il est aisé de voir par ce que je viens de dire et comme le jugement observé
est satisfaisant que le renversement de la matrice peut avoir lieu sans que l'opérateur
y ait contribué, lors que le placenta sera fort épais et fort dur tel qu'étaient ceux
dont je viens de parler et que la matrice aura cette disposition naturelle dependante
d'une faiblesse. si, dans les lit courantes saines, ou dans quelques unes d'elles sepa-
rément, une femme fait des efforts pour se delivrer, comme il arrive assez
souvent, elle determinera sans doute le fond de la matrice à se gonfler sur
lui même d'où son futur infailiblement son renversement. ne pourroit
on pas croire que la dame Roger, tandis que j'étais occupé à serresser la
ligature du nombril de son enfant, ait ainsi donné naissance à son
allié. ~~qui était déterminé par la contraction~~ si l'on joint à cela la faiblesse
de la matrice et le poids d'un gros placenta; le renversement de la matrice
n'aura rien d'étonnant.



Sur une apoplexie convulsive

L'accoucheur instruit se tient toujours sur ses gardes contre les accidens
qui accompagnent et suivent l'allouchement; mais le plus clair voyant peut
il prévoir qu'il a à redouter un accident absolument éloigné et qui
paraît n'avoir aucun rapport avec ceux que l'allouchement peut
faire naître: ou bien pour venir au fait, le travail de l'enfantement
a-t-il pu déterminer la rupture du kiste d'un dépôt déjà formé
sous le crâne suivie d'une apoplexie convulsive d'un bras et de
la mort? je ne vois rien d'impossible à cela et l'on pourra en
juger par le récit suivant.

obs. madame afscleneau de la paroisse de St Pierre en pont d'aleau,
éprouvait depuis quelques tems et par intervalle des douleurs de tête plus
ou moins fortes du côté droit qui ne cessaient que lorsqu'il était sorti
par l'oreille du même côté une quantité plus ou moins grande de
pus. cette dame, qui avait eu précédemment un ou plusieurs enfans,
fut prise de nouveau en juin 1778 par le travail d'enfant qui
sembla la conduire à un heureux allouchement; mais quel changement
subit et inattendu: elle tomba tout à coup dans une apoplexie profonde
et convulsive du bras droit seulement qui delivrait toujours un cercle
en passant par dessus le côté droit de la tête. le chirurgien ordinaire
demanda des consultants; je fus du nombre et nous trouvâmes cette
malade sans parole et sans aucuns mouvemens dans les autres membres.
d'après le récit que nous fit le chirurgien traitant de son état précédent
et de son état actuel, d'un côté nous opinâmes pour le trépan; mais d'un
autre côté, la matrice avait conservé de son irrégularité; elle entraînait

en contraction lors qu'on la touchait; D'ailleurs l'ovifère utérin était déjà bien dilaté et avait toute la disposition possible à l'être davantage: nous nous décidâmes donc à commencer par l'allouchement avec l'intention de procéder ensuite à l'opération du trepan. Les parents consentirent volontiers que l'on fit l'allouchement forcé qui fut terminé promptement et sans peine; mais ils s'opposèrent absolument à l'opération du trepan; et la malade mourut dans la nuit. Le lendemain nous fumes avertis pour l'ouvrir. Nous commençâmes par le ventre où nous ne trouvâmes rien de particulier: tous les viscères et la matrice même étaient en bon état. il n'en fut pas de même après l'ouverture du Vane; nous trouvâmes entre l'utérus et la dure mere du côté droit plus de trois onces d'un pus de bonne qualité et sans la moindre odeur qui nous parut avoir eu son siège sous l'apophyse Crista galli et qui s'était épanché et propagé jus que sous la Commencement du parietal droit. la dure mere était pressée près cette apophyse aussi trouvâmes nous du pus entre l'utérus et la pie mere qui était faite ainsi que le cerveau. on voit par ce que j'ai dit 1° que les douleurs de tête, qui se faisaient sentir principalement du côté droit, diminuaient ou cessaient lorsque le pus s'était fait jour par l'oreille droite 2° que le bras droit a été seul en convulsion depuis le commencement de l'apoplexie jusqu'à la mort 3° que l'épanchement était également du côté droit: d'où l'on peut conclure que l'opération du trepan décidée par les consultants et faite sur le champ, l'endroit étant indiqué, aurait peut être été salutaire.

Sur une cause particulière d'avortemens

on met au nombre des causes occasionnelles des avortemens ou allouchemens prématurés, la squirrosité du placenta, la varicelle ou les anévrysmes du cordon; mais je ne vois nulle part une cause particulière et qui ne me paraît point dépendante de celles ci; c'est le rétrécissement du cordon umbilical près le ventre de l'enfant sans que le reste du cordon parut avoir souffert si ce n'est qu'à terme prématuré, il avait le diamètre d'un cordon au terme naturel; mais droit et sans aucun nœud jus qu'à cinq travers de doigts du ventre de l'enfant où le cordon se rétrécit sensiblement et par degré d'une forme plus qu'un cordon également droit et sans nœuds du volume d'un très petit tuyau de plume à écrire. il serait intéressant d'expliquer le phénomène dont quelqu'un s'occupera peut être. Lors qu'on aura pris connaissance du fait.

obs. madame adeline de la paroisse de St pierre en pont d'orléans fit trois couches prématurées: la première à quatre mois et demi et les deux autres à six mois et demi de grossesse. Elle fut saignée une fois avant la première blessure, deux fois avant la seconde et son chirurgical ne jugea pas à

propos de la saigner avant la troisième quoiqu'elle eût souffert les étouffe-
ments et la douleur de côté qui l'avaient décliné les autres fois à lui ôter du
sang. Devenue grosse pour la quatrième fois, elle me pria de vouloir
bien lui donner mes soins pendant cette nouvelle grossesse et elle me fit le récit
de ses blessures ~~des~~ précédentes. quelques tems après c'est à dire vers le cinquième
mois de sa grossesse, elle fut atteinte des mêmes accidens qui avaient précédés les
premières couches (l'oppression et la douleur de côté) je lui fis deux
saignées légères en trois jours qui la soulagerent; mais qui ne firent
rien pour l'enfant: car elle accoucha de même à six mois et demi d'un
enfant mort et déjà en putrefaction. Ne sachant à quoi attribuer la cause
de la mort de tous ses enfants; connaissant d'ailleurs la mere pour très honnête
femme, je fis des recherches sur l'enfant pour tâcher de la découvrir. -
Le cordon fixa mon attention; il était d'un volume plus gros qu'il ne
l'est ordinairement à cet état depuis la plainte qui n'était point
squirreuse, jusqu'à environ cinq travers de doigts du nombril de l'enfant
d'où il diminuait sensiblement et par degré pour ne former qu'un cordon
dont la grosseur n'excedait pas celle d'un très petit tuyau de plume à
écrire ce qui me décida à mettre en usage d'autres moyens pendant la
grossesse suivante qui était la cinquième. Cette Dame qui était d'un
tempérament qui participait du sanguin et du mélancolique, était
continuellement en proie à une foule de peines de ménage qui la tenaient
dans une mélancolie profonde et l'obligeaient à mener une vie absolument
sédentaire, sans nourriture réglée; à quoi il faut ajouter un mari
violent harcelant toujours sa femme vive et réservée. je résolus pour prévenir
l'oppression et la douleur de côté pendant cette nouvelle grossesse de la
saigner tous les mois et de la purger légèrement de tems à autre; je l'engageai
aussi à soutenir le traitement par un régime doux et humectant bien
suivi et de substituer à sa vie sédentaire, celle de la tranquillité d'esprit
et l'exercice du corps. je lui fis donc une petite saignée à la fin de chacun
des trois premiers mois; elle fut ensuite purgée légèrement. au commencement
du cinquième elle contracta une maladie inflammatoire de poitrine
pour la quelle elle fut saignée plusieurs fois et purgée ensuite. elle se
porta assez bien jusqu'à la fin de son septième: mais l'oppression et
la douleur de côté ayant reparu dans un degré inférieur aux autres fois,
elle n'en parla pas et depuis ce tems, les mouvemens de l'enfant s'affai-
blirent de plus en plus, disparurent totalement et elle accoucha vers la
fin de son huitième mois d'un enfant mort. Le cordon se trouva comme
le précédent. Cette Dame devint grosse pour la sixième fois et me pria
d'ajouter quelques nouveaux moyens qui pourraient encore retarder sa
couches d'un mois espérant que si elle pouvait arriver au terme naturel,
son enfant étant plus fort, elle pourrait le mettre au monde vivant. -
je lui dis que je n'en voyais qu'un seul l'exclusion difficile dépendait
d'elle. elle me jura de faire tout sacrifiable et de l'exclure tant difficile

qu'il put être. je lui annonçai donc qu'elle devait se dépouiller de toute ~~sensibilité~~ sensibilité sur ses mauvaises affaires, braver l'infortune, n'être jamais seule chez elle, voir le plus souvent possible ses amies, de se livrer à tous les plaisirs de l'agréable société, d'aller à la campagne à pied ou en voiture si elle peut la supporter; enfin d'user d'aliments succulents et légers; je lui annonçai aussi que pendant sa grossesse, elle ferait usage de tems à autre de boissons delayantes et apéritives pour donner à son sang toute la fluidité nécessaire pour sa libre circulation; et quelquefois de boissons tonniques pour soutenir le ressort des vaisseaux. elle suivit ponctuellement le conseil que je lui donnai, évitant tout ce qui pourrait jeter du noir dans son esprit et se livrant entièrement à la gaieté. le moyen réussit au-delà de mon espérance; elle se porta bien pendant tout le tems de sa grossesse; prit de l'embonpoint et accoucha fort heureusement à terme le 7 juin 1781 d'un enfant vivant. le cordon avait très peu souffert. elle n'a plus eu d'enfants depuis par la perte de son mari

Sur une cloison qui separe le conduit vaginal en deux canaux

je ne sçai si l'on a aujourd'hui bien reconnu qu'une femme puisse avoir deux matris, ou si lors que la matrice est unique; celle-ci peut être partagée en deux cavités distinctes. Mr Moreau aphorisme vingt prétend que la matrice de la femme n'a qu'une seule cavité. Mr Levrel dans sa réponse à cet aphorisme convient que la matrice des femmes n'a naturellement qu'une cavité; mais que cette cavité est souvent distinguée en partie droite et en partie gauche par une ligne. le même auteur dans sa réponse à l'aphorisme 209 de Moreau dit ce Mais nous ne sommes pas assurés si alors il n'y aurait pas deux matris au lieu d'une comme il y en a nombre d'exemples; ou si la matrice unique ne se fait pas partagée en deux cavités distinctes, comme cela s'est vu maintes fois, par l'ouverture des cadavres. n'ayant jamais rencontré de faits de cette nature; je suis dispensé d'en parler; mais je peux dire que j'ai vu le conduit vaginal partagé en deux canaux par une cloison.

obs. madame xxx de la paroisse de St Liphard d'Orleans en travail de son premier enfant, me fit avvertir le 2. bre 1786 pour l'accoucher. je reconnus au toucher le vrai travail de la matrice: son orifice étoit fort aminci et déjà dilaté par la présence des eaux qui poussaient les membranes contre lui. dans l'intervalle de deux douleurs, je la touchai de nouveau et je reconnus à travers les enveloppes que l'enfant présentait un pied. je ne me hâtai point de les ouvrir, l'orifice utérin me paraissant point encore suffisamment ouvert pour y passer la main; mais les fortes contractions de la matrice les firent bientôt à se rompre: alors je

reconnu distinctement le pied droit; mais un obstacle que je ne connaissais
 pas m'empêcha de toucher le talon: je crus d'abord que la matrice n'étant
 point assez ouverte de ce côté pressait le talon de manière à ne pas
 permettre à mon doigt de glisser entre elle et le pied de l'enfant; mais je
 fus bientôt détrompé: car ayant porté de nouveau mon doigt qui se trouvait
 par hasard du côté du talon, je reconnus que l'obstacle n'était point la
 matrice et j'éprouvai la même difficulté en cherchant les doigts sans pouvoir
 les rencontrer. il fallait pourtant les trouver et allouement, et je ne voulais
 le faire qu'après avoir absolument reconnu l'obstacle. je portai donc
 mon doigt le plus loin qu'il me fut possible et je rencontrai cette fois les
 doigts du pied de l'enfant: ayant résolu de les dépasser, je sentis que mon
 doigt glissait au dessus d'un corps mince et assez solide; alors je touchai
 le pied dans sa totalité en passant derrière la malléole interne et en
 le ramenant par dessous la plante. je ne doutai plus qu'il n'y eût une
 cloison qui séparât le canal en deux; mais pour m'en convaincre et
 la reconnaître plus directement, je retirai mon doigt le long de cette
 cloison jusqu'à la vulve et sans l'abandonner, mon doigt se trouva de
 l'autre côté où je ne trouvais que le talon. je ne me contentai pas de cela,
 je la touchai à différentes fois entre mes doigts dans toute l'étendue de ses
 bords et de ses bords et je me procurai même le moyen de la voir à l'entrée
 de la vulve. cette cloison était telle qu'elle avait deux bords et quatre bords
 dont deux étaient fixes et les deux autres flottants: des deux bords fixes,
 l'un faisait corps avec toute la longueur de la partie antérieure du vagin,
 et l'autre faisait corps avec toute la longueur postérieure de ce canal:
 des deux bords flottants, le supérieur était mince et égal et répondait
 à l'orifice utérin et l'inférieur qui était épais de trois à quatre lignes
 était inégal et applati et répondait à la vulve: les deux bords étaient
 droits et gauches. quant à la situation du pied de l'enfant, elle était
 telle que la pointe regardait le côté gauche du bassin de la mère et
 le talon le côté droit; de manière que le milieu du tarse de la plante
 appuyait sur le bord supérieur de cette cloison et lui faisait de suite
 une portion de cercle. il était indispensable de bien reconnaître la
 disposition de cette cloison tant pour éviter les accidens que sa résistance
 aurait indubitablement déterminé au canal vaginal, que pour éviter ceux
 que sa rupture ou sa section auraient pu faire naître si les pieds
 de l'enfant se furent engagés dans l'un et l'autre canal. pour éviter
 à tous inconvénients, je glissai la main droite le long du bord gauche
 de la cloison que je pouvais derrière le talon; j'entrai ensuite dans
 la matrice pour chercher l'autre pied que j'unis au premier après m'être
 assuré qu'ils appartenant au même enfant (car il arrive quelque fois,

sans y être adhérents

Lors qu'une femme est grosse de deux enfants, que les membranes de l'un et de l'autre peuvent se rompre par la force du travail, je les fis fortir et successivement le Corps ayant attention de tenir avec l'autre main la cloison assujettie le long de la paroi droite du vagin: je degageai doucement les bras et fis fortir la tête avec précaution. La mère et l'enfant ne souffrirent aucunement pendant cette opération. après l'accouchement, j'examinai de nouveau le métristh vaginal: il avait supporté toute l'extension nécessaire pour le passage de l'enfant sans avoir éprouvé la moindre rupture.

Voilà ce que j'avais à dire sur les différents accouchemens contenus dans cet ouvrage: si ce travail peut être utile aux jeunes chirurgiens et agréable à l'Académie; ce sera pour moi un très grand plaisir d'avoir rassemblé tous ces faits

Le rapport de

j'aurais ajouté à cet ouvrage l'anatomisation faite au Collège de chirurgie d'Orléans, d'un enfant né en cette ville ayant deux têtes et une queue^{tt} si j'eusse été certain qu'on ne l'eût pas fait passer à l'Académie

tt au bas de la Colonne épistolaire

